

## GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS

Glucosamina sulfato 1,5 g  
Condroitín sulfato sódico 1,2 g

VÍA ORAL

Polvo

### LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE PORQUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USTED

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Si necesita consejo o más información, consulte a su médico.

Si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

### FÓRMULA

Cada sobre monodosis de 5,38 g contiene:

<b>Glucosamina sulfato</b> .....	1500 mg
<b>Condroitín sulfato sódico</b> (origen bovino).....	1200 mg
Excipientes.....	C.S.

### ¿QUÉ ES GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS contiene dos principios activos: condroitín sulfato sódico y glucosamina sulfato. Ambos principios activos pertenecen al grupo de los antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos.

GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS se utiliza en el tratamiento de los síntomas de la artrosis de rodilla en pacientes con dolor moderado a grave en los que esté indicado el tratamiento combinado con condroitín sulfato y glucosamina.

### NO TOMÉ ESTE MEDICAMENTO

- Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.
- GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS no debe administrarse en pacientes alérgicos al marisco ya que uno de los principios activos (glucosamina) se obtiene del marisco.

4513303840-18/05/18

### TENGA PRECAUCIÓN

Consulte a su médico antes de empezar a tomar GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS

- Si tiene alterada la tolerancia al azúcar (glucosa). Pueden ser necesarios controles más frecuentes de los niveles de azúcar en sangre cuando se empieza el tratamiento con glucosamina
- Si tiene cualquier alteración del riñón o del hígado, debido a que no se han realizado estudios en este tipo de pacientes y por tanto no pueden darse recomendaciones sobre dosificación
- Si padece alguna enfermedad grave del corazón
- El **Condroitín sulfato sódico** tiene un leve efecto antitrombótico; no obstante no se han informado episodios de sangrado tras la administración de **Condroitín sulfato sódico**. Se requiere precaución en aquellos pacientes que deben ser sometidos a una intervención quirúrgica.
- Administrar con precaución en pacientes sometidos a tratamientos con anticoagulantes o que padezcan afecciones que prolongan el tiempo de coagulación.

### EMBARAZO Y LACTANCIA

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

**Embarazo.** No existen datos suficientes sobre la utilización de **Condroitín sulfato sódico** y glucosamina en mujeres embarazadas. No se recomienda su uso durante el embarazo.

**Lactancia.** No existe información disponible sobre la eliminación de **Condroitín sulfato sódico** y glucosamina a través de la leche materna. No se recomienda su administración durante la lactancia.

### CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS

Si usted siente mareo o somnolencia, evite conducir o utilizar maquinaria.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DE GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS

GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS puede ser perjudicial para personas con fenilcetonuria porque contiene aspartamo que es fuente de fenilalanina.

### USO EN NIÑOS

No se recomienda el uso de este medicamento en niños o adolescentes menores de 18 años.

### USO DE OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

Se recomienda precaución si se administra GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS en combinación con otros medicamentos, sobre todo con:

- Algunos tipos de medicamentos utilizados para evitar la coagulación de la sangre (p. ej., warfarina, dicumarol, fenprocumol, acenocumarol y fludionda). El efecto de estos medicamentos se puede potenciar si se utilizan junto con glucosamina. Por lo tanto, los pacientes tratados con estas combinaciones deben ser vigilados de forma más cuidadosa al inicio o finalización del tratamiento con glucosamina
- Medicamentos para tratar las infecciones (antibióticos como la tetraciclina, el cloranfenicol o la penicilina)
- No existe interacción con la administración simultánea de analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos

### TOMA DE GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS CON ALIMENTOS Y BEBIDAS

Puede tomarlo antes, durante o después de las comidas. No obstante, si a menudo experimenta molestias de estómago con la toma de medicamentos, es aconsejable tomarlo después de las comidas.

4513303840

4513303840 GLUCOSAMINA / CONDROITIN FORTE ROEMMERS



ROEMMERS

hM Digital

FORMATO

160x130

SOORTE

PAP

ACTUALIZACIÓN

18/05/18

APROBACIÓN

18/05/18

PLEGADO

130 mm en 4



4 Tintas Pantone; Cyan + Magenta + Amarillo + Negro

Cyan

Magenta

Amarillo

Negro

DPTO. DE DISEÑO - Consultas técnicas; (00598) 2705 7219 / hmdigital@hmcreativos.com

### POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS puede producir efectos no deseados.

**Informe a su médico inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes efectos adversos: Infección de las vías respiratorias, infección de las vías urinarias o dolor de pecho.**

Otros efectos adversos:

**Frecuentes:** dolor de cabeza, diarrea, náuseas, indigestión, flatulencia (gases)

**Raros:** alteración del sentido del gusto, dolor de estómago, reflujo gastroesofágico, estreñimiento, acidez, distensión abdominal, calambres musculares, dolor en una extremidad, fatiga, infección de las vías respiratorias, infección de vías urinarias, aumento de los niveles de enzimas del hígado, alteraciones en los análisis de orina

Los efectos adversos observados en pacientes tratados únicamente con condroitin sulfato (y no descritos anteriormente) son los siguientes:

- **Muy raros:** edema, retención de agua, reacción de tipo alérgico

Los efectos adversos observados en pacientes tratados únicamente con glucosamina (y no descritos anteriormente) son los siguientes:

- **Poco frecuentes:** enrojecimiento o erupción de alguna zona de la piel y picores

- **Frecuencia no conocida:** hinchazón de la cara, la lengua o la garganta, urticaria, hinchazón/tumefacción de tobillos, piernas y pies, mareos, vómitos, empeoramiento en el control de la glucosa sanguínea en pacientes con diabetes mellitus

Por lo general, los efectos adversos que pueden aparecer durante el tratamiento con GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS son de carácter leve y desaparecen con la suspensión del tratamiento.

### ¿CÓMO TOMAR GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS?

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico.

**Adultos (incluyendo ancianos):** La dosis recomendada es un sobre una vez al día, a administrar al menos durante un período de 6 meses.

**Población pediátrica:** GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS no está recomendado para uso en niños o adolescentes menores de 18 años debido a la ausencia de datos sobre seguridad y eficacia.

**Insuficiencia renal y/o hepática:** No pueden darse recomendaciones en pacientes con insuficiencia renal o hepática debido a que no se han realizado estudios.

**Preparación para la administración:** Disolver completamente el contenido del sobre de GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS en un vaso con abundante agua (150 a 200 mL). Es posible que debido a las características propias de los principios activos tiendan a formarse pequeños grumos, sin que esto afecte la eficacia y la seguridad del medicamento. Puede tomar entonces todo el contenido del vaso sin haber disuelto totalmente los grumos o seguir diluyendo hasta obtener una solución.

Los sobres pueden tomarse antes, durante o después de las comidas. Es recomendable que los pacientes que suelen presentar intolerancia gástrica a los medicamentos en general lo tomen después de las comidas.

### SI TOMA MÁS GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS DEL QUE DEBE

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

Si usted ha tomado más GLUCOSAMINA/CONDROITIN FORTE ROEMMERS de lo que debe, puede experimentar dolor de cabeza, vértigos, desorientación, dolor en las articulaciones, náuseas, vómitos o diarrea, aunque es probable que no experimente ningún síntoma

### PRESENTACIONES

Envases conteniendo 30 sobres monodosis.

Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.

En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T., Tel.: 1722

### PRODUCTO MEDICINAL.

#### CONTROL MÉDICO RECOMENDADO.

**NO DEBE USARSE EN PACIENTES CON FENILCETONURIA PUES CONTIENE FENILALANINA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE INFERIOR A 30 °C.**

**INDUSTRIA URUGUAYA.**

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: [www.cimlatam.com](http://www.cimlatam.com) o envíenos un correo electrónico a [contacto@cimlatam.com](mailto:contacto@cimlatam.com) o comuníquese directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.



ROEMMERS S.A. Uruguay  
Cno. Maldonado 5634. Montevideo  
Atención Personalizada a Profesionales  
y Usuarios 0800-3000  
Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.  
[www.roemmers.com.uy](http://www.roemmers.com.uy)

4513303840



ROEMMERS

hM Digital

4513303840 GLUCOSAMINA / CONDROITIN FORTE ROEMMERS

FORMATO	SOORTE	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	PLEGADO
160x130	PAP	18/05/18	18/05/18	130 mm en 4
4 Tintas Pantone; Cyan + Magenta + Amarillo + Negro				

Cyan

Magenta

Amarillo

Negro

DPTO. DE DISEÑO - Consultas técnicas; (00598) 2705 7219 / [hmdigital@hmcreativos.com](mailto:hmdigital@hmcreativos.com)