

DOLEX Pediátrico

Paracetamol 240 mg / 5 mL

Vía oral
solución

LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE PORQUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USTED

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente. Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si necesita consejo o más información, consulte a su médico. Si los síntomas empeoran o persisten después de 5 días de tratamiento, debe consultar al médico. Si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:

Paracetamol.....	4.8 g
Propilenglicol.....	30 g
Glicerina.....	10 g
Sacarina.....	0,06 g
Azúcar.....	40 g
Metilparabeno	
Propilparabeno	
Exc.....	c.s.

¿QUÉ ES DOLEX Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

DOLEX es un medicamento cuyo como principio activo es el **Paracetamol** que es un analgésico con potentes propiedades antipiréticas (para bajar la fiebre).

Por su efecto analgésico está indicado en el tratamiento sintomático de cuadros dolorosos leves y/o moderados (cefaleas, mialgias, etc.).

Por su acción antipirética está indicado para bajar la fiebre que puede acompañar a cuadros de diferente origen: infeccioso (como estados gripales, resfríos, infecciones respiratorias, etc.), inmunológico (colagenopatías, inmunodeficiencias, etc.), o traumático.

NO TOME ESTE MEDICAMENTO SI:

- Es alérgico (hipersensible) al principio activo de DOLEX.
- Si padece alguna enfermedad en el hígado.

TENGA PRECAUCIÓN

- No tomar más dosis de las recomendadas.
- En pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico, debido a que se han descrito ligeras reacciones de broncoespasmo con **Paracetamol** (reacción cruzada) en estos pacientes, aunque solo se manifestaron en menos del 5% de los ensayos.

4554003840-16/11/17

- En caso de insuficiencia renal grave, (aclaramiento de la creatinina inferior a 10 mL/min.); el intervalo entre 2 tomas será como mínimo de 8 horas.
- **DOLEX pediátrico** contiene Aspartamo. No debe administrarse en pacientes con fenilcetonuria por su contenido de fenilalanina.

CONSULTE AL MÉDICO

Antes de iniciar el tratamiento con DOLEX, en pacientes con enfermedades renales, cardíacas o pulmonares y en pacientes con anemia.

Si el dolor se mantiene durante más de 10 días, la fiebre durante más de 3 días o bien el dolor o la fiebre empeoran o aparecen otros síntomas, interrumpir el tratamiento y realizar la consulta médica.

USO DE OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

EL PARACETAMOL PUEDE TENER INTERACCIONES CON LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS:

- Anticoagulantes orales (warfarina, etc.) utilizado a dosis elevadas, aumenta el riesgo de sangrado.
 - Antiepilépticos (fenitoína, carbamazepina) incrementa el riesgo de hepatotoxicidad.
 - Anticonceptivos reduce los efectos de **Paracetamol**.
 - Diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida) disminuye el efecto de los mismos.
 - Isoniazida, Rifampicina (utilizados para el tratamiento de la tuberculosis) incrementa el riesgo de hepatotoxicidad.
 - El uso conjunto con Lamotrigina disminuye el efecto terapéutico de la misma.
 - Probenecid (utilizado para el tratamiento de la gota) incrementa la eficacia del **Paracetamol**.
 - Propranolol (utilizado para el tratamiento de la hipertensión, arritmias cardíacas) potencia la acción del **Paracetamol**
 - Anticolinérgicos (utilizados para el alivio de espasmos o contracciones de estómago, intestino o vejiga) potencia el efecto de éstos complementándolo.
 - Zidovudina (utilizado para el tratamiento de las infecciones por VIH) aumenta riesgo de toxicidad hemática y hepática.
- No utilizar con otros analgésicos sin consultar al médico.

TOMA DE DOLEX CON LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS

La administración conjunta con alimentos y bebidas no afecta a la eficacia terapéutica del medicamento.

CÓMO TOMAR DOLEX

Siga exactamente las instrucciones de administración de DOLEX indicadas por su médico.

La dosis recomendada en pediatría es de 10 a 15 mg/kg/dosis, administrada cada 4 - 6 hs. No superar 5 dosis diarias.

Dosis máxima día en lactantes 75 mg/kg/día.

Dosis máxima día en niños menor a 100 mg/kg/día o 4 g/día.

Para niños mayores 12 años administrar de 650 mg o 1 g cada 4 a 6 hs. (dosis máxima 4 g/día).

Las dosis sugeridas en la en la tabla se encuentran dentro del rango de dosis recomendada.

Cada mL de solución contiene 48 mg de **Paracetamol**. (240 mg / 5 mL).

Dolex Pediátrico - 4554003840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO	
4554003840	145x210	16/11/17	16/11/17	PAP	1º) 210 mm al medio	2º) 105 mm en tres partes iguales

Diseño Gráfico hM Digital

Negro



Edad (años)	Peso Kg	mL/dosis
0 a 2	Menor a 3 kg	0,5 mL
	3-5	1 mL
	6-9	2 mL
2 a 3	10-12	3 mL
	13-15	4 mL
4 a 5	16-19	5 mL
6 a 8	20- 26	6 mL
9 a 10	27-32	8 mL
11 años	33-40	10 mL

Se administra por vía oral. Agite bien antes de usar.
Abra el frasco. Coloque la tapa perforada en la boca del frasco (este paso debe realizarse solamente antes del primer uso). Inserte la jeringa en el orificio de la tapa. Invierta el frasco y extraiga con la jeringa la dosis a administrar, tirando del émbolo. Administre la dosis directamente con la jeringa, orientada a la cara interna de la mejilla y sin ejercer demasiada presión.

Mantenga la jeringa en condiciones higiénicas adecuadas, lavando con agua, secando y guardando en el estuche. La administración de este medicamento está condicionada por la presencia dolor y/o fiebre, por lo que a medida que desaparezcan dichos síntomas se debe suspender su administración.

INTERRUMPIR EL TRATAMIENTO Y CONSULTAR AL MÉDICO SI:

Si el dolor se mantiene durante más de 5 días.
Si la fiebre persiste durante más de 3 días.
Si el dolor o la fiebre empeoran o aparecen otros síntomas.
En caso de insuficiencia renal se recomienda aumentar el intervalo entre dosis. En cuadros severos está justificado administrar una dosis menores a las recomendadas.

SI TOMA MÁS DOLEX DEL QUE DEBIERA

Si se ha ingerido una sobredosis, (en niños, superior a 4 g/día) debe acudir rápidamente a un centro médico aunque no haya síntomas, ya que a menudo no se manifiestan hasta pasados 3 días desde la ingestión de la sobredosis, aún en casos de intoxicación grave.

Los síntomas de sobredosis pueden ser: mareos, náusea, vómitos, pérdida de apetito, coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia) y dolor abdominal.

El tratamiento de la sobredosis es más eficaz si se inicia dentro de las 4 horas siguientes a la toma del medicamento.

Los pacientes en tratamiento con barbitúricos o los alcohólicos crónicos pueden ser más susceptibles a la toxicidad de una sobredosis de *Paracetamol*.

En caso de intoxicación consulte inmediatamente a la emergencia médica.

SI OLVIDÓ TOMAR DOLEX

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas, simplemente tome la dosis olvidada cuando se acuerde y tome

las siguientes dosis con la separación entre tomas indicada en cada caso (4 – 6 horas).

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, **DOLEX** puede producir efectos no deseados.

DOLEX puede dañar el hígado a dosis altas (en niños superiores a 4 g / día) o en tratamientos prolongados.

Con el uso de *Paracetamol*, ocasionalmente puede observarse a nivel dermatológico erupciones cutáneas, prurito (picazón en la piel). A nivel hematológico disminución de células sanguíneas (glóbulos blancos, glóbulos rojos, neutrófilo, etc.).

También se han reportado casos de hipoglucemia (disminución de glucosa), hipotensión (descenso de la presión arterial), cefaleas e insomnio.

Excepcionalmente se ha reportado síndrome de Steven Johnson (que se caracterizan por ampollas y lesiones en piel y mucosas), falla hepática y neumonitis.

No se alarme por esta lista de posibles efectos adversos. Lo más probable es que no presente ninguno de ellos. Ante cualquier duda, consulte a su médico.

PRESENTACIÓN DE DOLEX

Envases conteniendo 60 mL y jeringa dosificadora.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

Producto medicinal

Manténgase fuera del alcance de los niños

Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas consulte a su médico

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com o envíenos un correo electrónico a contacto@cimlatam.com.

Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico. En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.

Industria Uruguaya

Venta libre en condiciones reglamentarias

Elaborado en **ROEMMERS S.A.**

Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios

☎ 0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

www.roemmers.com.uy



ROEMMERS

CONCIENCIA POR LA VIDA

4554003840-16/11/17

Dolex Pediátrico - 4554003840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO	
4554003840	145x210	16/11/17	16/11/17	PAP	1º) 210 mm al medio	2º) 105 mm en tres partes iguales

Diseño Gráfico hM Digital

Negro

