

DOLEX

Paracetamol 500 y 650 mg

Comprimidos

Vía oral

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento

Conservar este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

DOLEX se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.

Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 3 días, debe consultar a su médico.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:

DOLEX 500	500 mg
Paracetamol	C.S.
DOLEX 650	650 mg
Paracetamol	C.S.

¿QUÉ ES DOLEX Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

DOLEX son comprimidos para administración por vía oral que contienen Paracetamol. Se presentan en blísters conteniendo 8 comprimidos y en frascos contiendo 30 comprimidos.

DOLEX pertenece al grupo de medicamentos denominados analgésicos (alivio del dolor) y antipiréticos (disminución de la fiebre).

DOLEX está indicado en adultos y niños a partir de 10 años para el alivio sintomático de dolores ocasionales leves o moderados, como dolores de cabeza, dentales, musculares (contracturas) o de espalda (lumbago), así como en estados febriles.

ANTES DE USAR DOLEX

No tomar DOLEX si es alérgico a Paracetamol o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento

Precauciones:

- No tome más de la dosis recomendada
- Si padece enfermedades renales, cardíacas o pulmonares y/o anemia, consulte con el médico antes de tomar el medicamento.
- La utilización de Paracetamol en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o más medidas de bebidas alcohólicas al día) puede provocar daño hepático
- En alcoholistas crónicos, se deberá tener la precaución de no tomar más de 2 g/día de Paracetamol.
- Pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico.
- Si padece enfermedad hepática, malnutrición crónica o deshidratación deberá consultar con el médico antes de tomar este medicamento
- Si está en tratamiento con algún medicamento para tratar la epilepsia debe consultar al médico antes de tomar este medicamento debido a que, cuando se usan al mismo tiempo, se disminuye la eficacia y se potencia la hepatotoxicidad del Paracetamol, especialmente en tratamientos con dosis altas de Paracetamol.
- Niños con peso inferior a los 33 kg (menores de 10 años) porque no permite una adecuada dosificación.

4554006840-26/07/17

Niños

Los niños menores de 12 años, pueden tomar medio comprimido por toma. Los niños menores de 12 años no deben tomar este medicamento sin antes consultar al médico. Este medicamento no es apropiado para su administración a niños menores de 10 años.

Embarazo y lactancia

Si usted está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Datos epidemiológicos del uso oral de dosis terapéuticas de Paracetamol, indican que no se producen efectos indeseables ni en la embarazada, en el feto, ni en el recién nacido, por lo que bajo condiciones normales de uso, el Paracetamol se puede usar durante el embarazo.

Si usted está amamantando, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Pueden aparecer pequeñas cantidades de Paracetamol en la leche materna y es importante la opinión de su médico al respecto

Conducción y uso de máquinas

No se ha descrito ningún efecto sobre la capacidad para conducir vehículos o utilizar maquinaria debido a la toma de este medicamento.

USO DE OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

El Paracetamol puede tener interacciones con los siguientes medicamentos:

- Anticoagulantes
 - Antiepilépticos (lamotrigina, fenitoína, fenobarbital, metilfenobarbital, primidona)
 - Anticonceptivos
 - Diuréticos (como el furosemeo)
 - Cloranfenicol (antibiótico)
 - Isoniazida (utilizado para el tratamiento de la tuberculosis).
 - Probenecid (utilizado para el tratamiento de la gota).
 - Propanolol (utilizado para el tratamiento de la hipertensión y de arritmias).
 - Rifampicina (utilizado para el tratamiento de la tuberculosis).
 - Anticolinérgicos (utilizados para el alivio de espasmos del tubo digestivo y vejiga).
 - Zidovudina (utilizado para el tratamiento de las infecciones por VIH).
 - Colestiramina (utilizado para disminuir los niveles de colesterol).
 - No utilice DOLEX junto con otros analgésicos sin consultar a su médico.
 - Barbitúricos.
 - Metoclopramida y Domperidona.
- No utilizar con otros analgésicos (medicamentos que disminuyen el dolor) sin consultar al médico.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, DOLEX puede tener efectos adversos (aunque son raros).

DOLEX puede producir los siguientes efectos adversos, ordenados de acuerdo a su frecuencia:

Raros (menos de un caso por cada 100 pacientes): malestar, descenso de la presión y aumento de transaminasas en sangre.

Muy raro (menos de un caso por cada 10.000 pacientes): reacciones alérgicas, disminución de la glucosa, alteraciones sanguíneas, del hígado y del riñón.

Puede dañar el hígado si se toma en dosis altas o en tratamientos prolongados.

Ante cualquier duda, consulte a su médico.

CÓMO TOMAR DOLEX

DOLEX se administra por vía oral.

Los comprimidos deben tomarse con un vaso de líquido, preferentemente agua. Se pueden tomar tanto con alimentos como sin ellos. Para un alivio rápido del dolor, tomar el medicamento sin alimentos.

Siga exactamente las instrucciones de administración de DOLEX indicadas por su médico.

DOLEX - 4554006840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
4554006840	95x130	26/07/17	26/07/17	Mayor a 60 g/m ²	130 mm en 5

Diseño Gráfico WM Digital

Negro



Las dosis habitualmente recomendadas son:

DOLEX 500:

Adultos y adolescentes mayores de 15 años y peso superior a 50 kg:

- 1 o 2 comprimidos 3 a 4 veces al día. Las tomas deben espaciarse al menos 4 horas. Dosis máxima diaria: 3 g (6 comprimidos)

Adultos de bajo peso (< 50 kg):

- 1 comprimido por toma cada 6 ó 4 horas. Dosis máxima diaria: 2 g (3 comprimidos)

Niños y adolescentes menores de 15 años:

Es necesario respetar las posologías definidas en función del peso.

La edad del niño en función del peso se da a título informativo.

La dosis diaria recomendada de **Paracetamol** es aproximadamente de 60 mg/kg/día, que se reparte en 4 ó 6 tomas diarias, es decir 15 mg/kg cada 6 horas ó 10 mg/kg cada 4 horas.

- Niños entre 33 y 40 kg de peso (de 10 a 12 años): 1 comprimido por toma, cada 6 horas, hasta un máximo de 4 comprimidos al día.

- Entre 41 y 50 kg de peso (de 12 a 15 años): 1 comprimido por toma, cada 6 ó 4 horas según peso, hasta un máximo de 4 comprimidos al día.

Este medicamento no es apropiado para su administración a niños con peso inferior a 33 kg (aproximadamente menores de 10 años).

DOLEX 650:

Adultos y adolescentes mayores de 15 años y peso superior a 50 kg:

- ½ comprimido (325 mg) o 1 comprimido (650 mg), de 3 a 4 veces al día. Las tomas deben espaciarse al menos 4 horas. Dosis máxima diaria: 3 g (4 comprimidos y ½)

Adultos de bajo peso (< 50 kg):

- ½ a 1 comprimido por toma cada 6 ó 4 horas. Dosis máxima diaria: 2 g (3 comprimidos)

Niños y adolescentes menores de 15 años:

Es necesario respetar las posologías definidas en función del peso. La dosis recomendada es de 60 mg/kg/día que se reparte en 4 ó 6 tomas diarias, es decir 15 mg/kg cada 6 horas ó 10 mg/kg cada 4 horas. La edad del paciente en función del peso se da a título informativo.

- Peso entre 33 y 40 kg (aproximadamente de 10 a 12 años): medio comprimido por toma, cada 6 horas. Dosis máxima diaria: 3 comprimidos

- Peso entre 41 y 50 kg (aproximadamente de 12 a 15 años): medio ó 1 comprimido por toma, cada 6 ó 4 horas según su peso. Dosis máxima diaria: 3 comprimidos y medio.

Este medicamento no es apropiado para su administración a niños con peso inferior a 33 kg (aproximadamente menores de 10 años).

La dosis diaria eficaz no debe exceder de 60 mg/kg/día (hasta un máximo de 2 g/día) en las siguientes situaciones:

- Adultos que pesen menos de 50 kg.
- Insuficiencia hepática de leve a moderada, síndrome de Gilbert (ictericia no hemolítica familiar).
- Deshidratación.
- Malnutrición crónica.
- Alcohollismo crónico.

Pacientes con enfermedades del hígado:

Antes de tomar este medicamento tienen que consultar a su médico. Deben tomar la cantidad de medicamento prescrita por su médico con un intervalo mínimo entre cada toma de 8 h. No deben tomar más de 2 gramos de DOLEX en 24 horas.

Pacientes con enfermedades del riñón: Antes de tomar este medicamento tienen que consultar a su médico. Pueden tomar medio comprimido por toma. Existen presentaciones más adecuadas para estos pacientes.

Pacientes de edad avanzada: deben consultar a su médico. Se recomienda reducir la dosis del adulto en un 25%.

SI OLVIDÓ DOLEX

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tome la dosis olvidada cuando se acuerde, tomando las siguientes dosis con la separación entre tomas indicada en cada caso.

SI TOMA MÁS DOLEX DEL QUE DEBIERA

Si usted toma más DOLEX del que debiera, consulte inmediatamente a su médico o al C.I.A.T.

Si ha tomado una sobredosis, acuda rápidamente a un centro médico aunque no presente síntomas, ya que a menudo éstos no se manifiestan hasta pasados 3 días desde la ingestión de la sobredosis, incluso en casos de intoxicación grave.

Los síntomas de sobredosis pueden ser mareos, vómitos, pérdida de apetito, coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia) y dolor abdominal.

El tratamiento de la sobredosis es más eficaz si se inicia dentro de las 4 horas siguientes a la ingestión del medicamento.

Los pacientes en tratamiento con barbitúricos o los alcohólicos crónicos, pueden ser más susceptibles a la toxicidad de una sobredosis de **Paracetamol**.

PRESENTACIÓN DE DOLEX

Dolex 500: Envases conteniendo 8 y 30 comprimidos.

Dolex 650: Envases conteniendo 8 comprimidos.

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud.

Producto medicinal.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente, inferior a 30 °C

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico. En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.

Industria Uruguaya

Elaborado en **ROEMMERS S.A.**

Cno. Maldonado 5634. Montevideo, Uruguay

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios

0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

www.roemmers.com.uy

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com

O envíenos un correo a contacto@cimlatam.com. Toda comunicación a través de este sitio es confidencial y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.



ROEMMERS

CONCIENCIA POR LA VIDA

4554006840-26/07/17

DOLEX - 4554006840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
4554006840	95x130	26/07/17	26/07/17	Mayor a 60 g/m ²	130 mm en 5

Diseño Gráfico hM Digital

Negro

