

ANTIAX
Comprimidos masticables
Suspensión
Vía oral

FÓRMULAS

ANTIAX Comprimidos masticables:
Cada comprimido masticable contiene:

Alginato de sodio 250,0 mg
Bicarbonato de sodio 133,5 mg
Carbonato de calcio 80,0 mg
Excipientes C.s.
Contenido de sodio total 65 mg/comprimido masticable.

ANTIAX suspensión:
10 mL de suspensión contienen:

Alginato de sodio 500,0 mg
Bicarbonato de sodio 267,0 mg
Carbonato de calcio 160,0 mg
Excipientes C.s.
Contiene Metilparabeno y Propilparabeno como conservantes.
Contenido de sodio total 127 mg/10 mL.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Tratamiento de los síntomas por hiperacidez gástrica y ardor causado por reflujo gastroesofágico.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

ANTIAX comprimidos masticables:
Posología
Adultos y adolescentes a partir de 12 años: de 2 a 4 comprimidos según necesidad.
Población pediátrica: El tratamiento de niños menores de 12 años no se recomienda, su administración queda a criterio del médico tratante.
Forma de administración

Este medicamento se administra por vía oral.
Antes de tragar, masticar el comprimido hasta que se separe en trozos pequeños.
Se debe administrar preferiblemente tras las comidas y antes de acostarse.
Como con todos los antiácidos, si los síntomas persisten más de 7 días a pesar del tratamiento continuo, se deberá evaluar la situación clínica.
ANTIAX suspensión:
Posología
Adultos y adolescentes a partir de 12 años: de 10 a 20 ml según necesidad.
Población pediátrica: El tratamiento de niños menores de 12 años no se recomienda, su administración queda a criterio de médico tratante.
Forma de administración
Este medicamento se administra por vía oral.
AGITAR BIEN ANTES DE USAR
Un cambio en la consistencia o viscosidad de la suspensión no implica cambio alguno en las propiedades terapéuticas ni en la seguridad del producto. Se resuelve agitando adecuadamente el envase antes de usar.
Medir la cantidad a tomar con el vaso dosificador y beber directamente.
Lavar el vaso dosificador luego de utilizarlo.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.
Insuficiencia renal grave.
Hipercalcemia, o condiciones que provocan hipercalcemia.
Antecedentes de hipofosfatemia.
Nefrolitiasis debida a cálculos renales de calcio.

PRECAUCIONES

Evitar el uso prolongado porque incrementa el riesgo de desarrollar cálculos renales.
La administración de dosis altas durante periodos largos de tiempo puede producir efectos indeseables, hipercalcemia y síndrome de leche alcalina, especialmente en pacientes con insuficiencia renal.
El medicamento no se debe administrar con grandes cantidades de leche o productos lácteos.
Si los síntomas persisten o solo se alivian parcialmente, se deberá evaluar la situación clínica porque, como ocurre con otros antiácidos, con este tratamiento se puede enmascarar los síntomas de una afección gástrica maligna.
Este medicamento no se debe administrar en los siguientes casos:
Hipercalciuria.
Pacientes con alteraciones de la función renal. Si se administra a pacientes con alteración de la función

8538902840-27/04/18

8538902840

8538902840 Antiax

FORMATO

103x138

SOPORTE

Mayor a 60 g/m²

ACTUALIZACIÓN

27/04/18

APROBACIÓN

03/05/18

PLEGADO

103 mm en 3 según esquema

33 mm 36 mm 34 mm




1 Tinta Pantone Negro



hM Digital

NEGRO



renal, los niveles plasmáticos de calcio, fosfato y magnesio se deberían monitorizar regularmente. En general no se deben administrar antiácidos que contienen calcio a pacientes con estreñimiento, hemorroides y sarcoidosis salvo mejor criterio médico. Existe posibilidad de reducción de la eficacia en pacientes con niveles muy bajos de ácido gástrico. Pacientes con fenilcetonuria, porque los comprimidos contienen aspartamo que es una fuente de fenilalanina.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Se debe dejar un intervalo de dos horas entre la administración de **ANTIAX** y otros medicamentos, especialmente antihistamínicos H₂, algunos antibióticos (tetraciclinas, y quinolonas), glucosidos cardiacos (digoxina y digitoxina), fluoruros, fosfatos, sales de hierro, ketoconazol, neurolépticos, tiroxina, penicilamina, beta-bloqueantes (atenolol, metoprolol, propanolol), glucocorticoides, cloroquina y difosfonatos.

INTERFERENCIAS CON PRUEBAS ANALÍTICAS

La administración de antiácidos puede producir alteraciones en los resultados de pruebas analíticas debido a que, con el uso prolongado y excesivo, el pH urinario puede aumentar mientras que la concentración sérica de fosfatos y de potasio puede disminuir.

EMBARAZO Y LACTANCIA

ANTIAX puede ser utilizado durante el embarazo y la lactancia. Ante cualquier duda consulte a su médico tratante.

De todos modos, teniendo en cuenta la presencia de **Carbonato de calcio**, se recomienda limitar al máximo la duración del tratamiento y evitar la ingesta concomitante de leche y productos lácteos para prevenir el exceso de calcio que puede desencadenar un síndrome de leche- alcalino.

REACCIONES ADVERSAS

Se ha notificado en ocasiones muy raras reacciones adversas de tipo alérgico como urticaria o broncoespasmo, y reacciones anafilácticas o anafilactoides.

En casos, esporádicos, por uso prolongado y de altas dosis, puede generar trastornos del metabolismo y de la nutrición como hipercalcemia y alcalosis así como el síndrome de Burnett (síndrome leche-alcalino).

SOBREDOSIS

Los síntomas de una sobredosis debida a un uso prolongado y de dosis altas, pueden generar un cuadro dado por: distensión abdominal, nauseas, y vómitos, fatiga, confusión, poliuria, polidipsia, y deshidratación sobre todo en pacientes con la función renal alterada.

PRESENTACIONES

ANTIAX comprimidos masticables: Envases conteniendo 10 comprimidos masticables.

ANTIAX suspensión: Frascos conteniendo 150 mL.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

Producto medicinal

Manténgase fuera del alcance de los niños

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com o envíenos un correo electrónico a contacto@cimlatam.com.

Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico. En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T.-Tel.:1722

Industria Uruguaya

Venta libre en condiciones reglamentarias.

Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas, consulte a su médico.

Elaborado en **ROEMMERS S.A.**

Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios

0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

www.roemmers.com.uy



Roemmers
CONCIENCIA POR LA VIDA

8538902840-27/04/18

8538902840

8538902840 Antiax



ROEMMERS

hM Digital

FORMATO

103x138

SOPORTE

Mayor a 60 g/m²

ACTUALIZACIÓN

27/04/18


APROBACIÓN

03/05/18

PLEGADO

103 mm en 3 según esquema

34 mm 36 mm 33 mm



1 Tinta Pantone Negro

NEGRO