

DOLEX FLEX

**Paracetamol 450 mg +
Orfenadrina Citrato 35 mg**
Comprimidos recubiertos
Vía oral

**LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE ANTES DE
COMENZAR EL TRATAMIENTO**

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.

Si considera que presenta algún efecto adverso, o tiene alguna duda consulte a su médico.

FÓRMULA

Cada comprimido ranurado de DOLEX FLEX contiene:
Paracetamol450 mg
Orfenadrina Citrato35 mg
Exc.c.s.

¿QUÉ ES DOLEX FLEX Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

DOLEX FLEX contiene Paracetamol que pertenece al grupo de medicamentos denominados antiinflamatorios no esteroideos (AINES), con acción analgésica (calma el dolor), antiinflamatoria y antipirética (disminuye la fiebre), y contiene Orfenadrina que es un relajante muscular del músculo esquelético.

DOLEX FLEX ESTÁ INDICADO PARA EL MANEJO DE:

Afecciones dolorosas agudas del sistema músculo-esquelético:

- esguinces y torceduras
- prolapso de disco intervertebral
- trauma cervical
- torticollis aguda
- otras condiciones musculares dolorosas.
- Espasmo muscular.
- Cefalea tensional.

NO TOMES DOLEX FLEX SI:

- Es alérgico a la Orfenadrina o Paracetamol.
- Tiene Glaucoma
- Padece Porfiria
- Padece Hipertrofia prostática
- Tiene Obstrucción de las vías urinarias
- Padece Miastenia Gravis
- Tiene Insuficiencia hepática o renal
- Presenta desórdenes obstructivos del tracto gastrointestinal
- Es menor de 12 años

- Si padece úlcera de estómago o duodeno activa, o hemorragia digestiva activa.
- Si ha sufrido previamente hemorragia o perforación de estómago mientras tomaba antiinflamatorios no esteroideos (AINES).

TENGA PRECAUCIÓN:

En caso de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y en pacientes añosos, DOLEX FLEX deberá utilizarse con precaución.

La utilización de paracetamol en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o más bebidas alcohólicas al día) puede provocar daño hepático. En alcohólicos crónicos, no se debe administrar más de 2 g/día de paracetamol.

Se recomienda precaución en pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico.

Se debe limitar la automedicación con paracetamol cuando se está en tratamiento con anticonvulsivantes debido a que con el uso concomitante de ambos se potencia la hepatotoxicidad.

CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE EMPEZAR A TOMAR

DOLEX FLEX SI:

- padece o ha padecido alguna vez problemas de estómago o de intestino como por ejemplo, úlceras o hemorragias
- tiene problemas de riñón graves, del hígado o del corazón
- está tomando medicamentos anticoagulantes u otros antiinflamatorios
- tiene problemas de corazón, ha sufrido algún derrame cerebral o piensa que podría tener riesgo de padecer estas enfermedades (por ejemplo, si tiene la presión arterial alta, diabetes o colesterol alto o fuma)
- tiene sensación de debilidad (tal vez a causa de una enfermedad)
- tiene alteraciones de la coagulación de la sangre
- tiene alteraciones arteriales en cualquier parte de su cuerpo
- tiene hiperlipidemia
- tiene una enfermedad autoinmune, como "lupus eritematoso sistémico" y colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn

USO DE OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica:

- Anticolinérgicos: Atropina, Fenotiazina
- Antidepresivos
- Otras drogas depresoras del Sistema Nervioso Central: antihistamínicos, sedantes, ansiolíticos, analgésicos opioides, barbitúricos, anticonvulsivantes, anestésicos, otros relajantes musculares, alcohol
- Anticoagulantes orales (acenocumarol, warfarina)
- Metoclopramida, Domperidona
- Cloranfenicol, Rifampicina
- Zidovudina
- Anticonceptivos hormonales/estrógenos (disminuyen los niveles plasmáticos de paracetamol)
- Anticonvulsivantes: fenitoína, fenobarbital, metilfenobarbital, primidona (disminuyen de la biodisponibilidad del paracetamol y potencian la hepatotoxicidad)

8542801840-27/04/18

DOLEX FLEX - 8542801840


1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
8542801840	103x138	27/04/18	30/04/18	Mayor a 60 g/m ²	103 mm en 3 según esquema

Diseño Gráfico hM Digital

Negro

FRENTE



- Lamotrigina (disminución de la biodisponibilidad de lamotrigina)
- Probenecid
- Diuréticos de asa (sus efectos de los diuréticos pueden verse reducidos)
- Isoniazida
- Alcohol etílico (aumenta el riesgo de hepatotoxicidad)

Informe a su médico si consume alcohol

EMBARAZO Y LACTANCIA

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS

Antes de conducir o manejar máquinas, se sugiere ver la respuesta del organismo al medicamento dado a los efectos anticolinérgicos de la orfenadrina: mareos, vértigo, somnolencia, o alteraciones visuales.

¿CÓMO TOMAR DOLEX FLEX?

Siga exactamente las instrucciones de administración de DOLEX FLEX indicadas por su médico.

Ingiera los comprimidos con una cantidad suficiente de agua, preferentemente durante las comidas.

Dosis adultos: La dosis recomendada es de 1 o 2 comprimidos 3 veces al día

Dosis pediátrica: no se recomienda su uso en niños menores de 12 años

Personas con insuficiencia renal (con un clearance de creatinina menor a 20 ml/min) e insuficiencia hepática: ajustar la dosis a la mínima necesaria.

Adultos mayores. Debido a la mayor susceptibilidad en esta población de presentar efectos secundarios se recomienda reducir la dosis y ajustarla a la mínima necesaria.

SI TOMA MÁS DOLEX FLEX DEL QUE DEBIERA

En casos de sobredosis pueden ocurrir: dolor abdominal, vómitos, sudoración excesiva, mareo, dificultad para respirar, cianosis, excitación, confusión, convulsiones, taquicardia, dilatación pupilar, retención urinaria.

La sobredosis con **Paracetamol** puede causar daño hepático pero que puede no manifestarse hasta días después de la ingesta. En caso de intoxicación consulte inmediatamente a la emergencia médica.

SI OLVIDÓ TOMAR DOLEX FLEX

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, **DOLEX FLEX** puede producir efectos no deseados.

Las reacciones adversas que más se han notificado durante el periodo de utilización de paracetamol son: hepatotoxicidad, toxicidad renal, alteraciones en la fórmula sanguínea, hipoglucemia, dermatitis alérgica.

Algunos efectos reportados, debidos a la acción anticolinérgica de la Orfenadrina son: sequedad bucal, náuseas, visión borrosa, mareos, y desasosiego.

Estos síntomas desaparecen rápidamente tras la reducción de la posología o la cesación del tratamiento.

Frecuentes: Sequedad bucal

Menos frecuentes: Estreñimiento, debilidad muscular, aumento de la presión intraocular, midriasis, náuseas, retención urinaria, somnolencia, taquicardia, visión borrosa, vértigo

Raros: erupción cutánea, sedación, confusión mental, delirio, alteraciones en las células sanguíneas

PRESENTACIÓN DE DOLEX FLEX

Envases conteniendo 8 comprimidos recubiertos.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Este medicamento no contiene azúcar.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico. En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.

Producto medicinal

Manténgase fuera del alcance de los niños

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com o envíenos un correo electrónico a contacto@cimlatam.com.

Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

Industria Uruguaya

Control médico recomendado

Elaborado en ROEMMERS S.A.

Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios

0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

www.roemmers.com.uy



ROEMMERS
CONCIENCIA POR LA VIDA

8542801840-27/04/18

DOLEX FLEX - 8542801840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
8542801840	103x138	27/04/18	30/04/18	Mayor a 60 g/m ²	103 mm en 3 según esquema

Diseño Gráfico hM Digital

Negro

34 mm	36 mm	33 mm
DORSO		