

# Amoxidal

## Amoxicilina

Vía oral

Polvo para preparar suspensión  
Comprimidos

### Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

### Fórmulas

**Amoxidal 250** suspensión pediátrica: Cada 5 mL (1 medida) contiene: Amoxicilina 250 mg; Metilparabeno; Azúcar 2,1 g; Exc. c.s.

**Amoxidal 500** comprimidos: Cada comprimido contiene: Amoxicilina 500 mg; Exc. c.s.

**Amoxidal 500** suspensión: Cada 5 mL (1 medida) contiene: Amoxicilina 500 mg; Metilparabeno; Azúcar 1,8 g; Exc. c.s.

**Amoxidal 750** comprimidos: Cada comprimido contiene: Amoxicilina 750 mg; Exc. c.s.

**Amoxidal 750** suspensión: Cada 5 mL (1 medida) contiene: Amoxicilina 750 mg; Metilparabeno; Azúcar 1,5 g; Exc. c.s.

**Amoxidal 875** comprimidos: Cada comprimido contiene: Amoxicilina 875 mg; Exc. c.s.

### ¿Qué es Amoxidal y para qué se utiliza?

Amoxidal es un antibiótico bactericida de amplio espectro, perteneciente al grupo de los betalactámicos, activo frente a microorganismos Gram positivos y Gram negativos. Actúa inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. Administrado por vía oral, logra rápidamente niveles hemáticos elevados.

Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones virales como la gripe o el catarro. Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento indicadas por su médico.

No guarde ni reutilice este medicamento.

Amoxidal está indicado en el tratamiento de todas las infecciones causadas por gérmenes sensibles, especialmente aquellas localizadas en:

- Aparato respiratorio superior (incluyendo ORL) e inferior: tales como amigdalitis, sinusitis, otitis media, bronquitis aguda y crónica, neumonías bacterianas y bronconeumonía.
- Aparato genitourinario: Nefritis, cistitis, uretritis, pielonefritis, bacteriuria, gonorrea, cervicitis y salpingitis.
- Cavidad bucal: Infecciones de origen dentario, periodontitis, gingivitis.
- Infecciones de piel y tejidos blandos.
- Infecciones del tracto y vesícula biliar.
- Tratamiento de erradicación de *Helicobacter pylori* en asociación con un inhibidor de la bomba de protones.
- Profilaxis de la endocarditis: Amoxidal puede utilizarse en la prevención de bacteriemia asociada con el desarrollo de endocarditis.

### No tome Amoxidal

- si es alérgico a la amoxicilina, penicilinas o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento
- Si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a cualquier otro antibiótico. Esto podría incluir erupción en la piel o hinchazón de la cara o la garganta.

### Tenga precaución

Consulte a su médico antes de tomar Amoxidal si:

1106307840-05/06/18

- tiene mononucleosis infecciosa (fiebre, dolor de garganta, glándulas hinchadas y cansancio extremo)
- tiene problemas de riñón
- no orina regularmente
- Amoxidal al igual que otros antibióticos, puede afectar la flora intestinal

La Amoxicilina puede alterar los resultados de algunos análisis de sangre y orina

- análisis de orina (glucosa en orina) o análisis de sangre para la función hepática
- análisis de estríol (utilizado durante el embarazo para comprobar si el bebé se desarrolla de forma normal)

### Embarazo y lactancia

Consulte a su médico antes de utilizar éste o cualquier medicamento. Amoxidal pertenece a la categoría B y por lo tanto puede ser utilizado durante el embarazo. No existe riesgo fetal demostrado en humanos.

Amoxidal puede ser administrado durante el período de lactancia. Sin embargo, la lactancia materna debe ser interrumpida si en el recién nacido aparecen trastornos gastrointestinales, candidiasis o erupciones cutáneas.

### Conducción y uso de máquinas

Amoxidal puede tener efectos adversos y los síntomas (como reacciones alérgicas, mareos y convulsiones) pueden hacer que no deba conducir. No conduzca o maneje maquinaria a no ser que se encuentre bien.

### Información importante sobre algunos de los componentes de Amoxidal

Amoxidal suspensión contiene sacarosa, se recomienda precaución en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, mala absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.

### Información importante sobre el comprimido de Amoxidal

La ranura sirve únicamente para fraccionar y facilitar la deglución pero no para dividir en dosis iguales.

### Posología

La posología y frecuencia de administración serán recomendadas por el médico tratante dependiendo del tipo y severidad de la infección. A modo de guía se presentan las siguientes dosis habituales:

**Adultos y niños de más de 40 kg**

Dosis diaria de 1,5 g a 3 g administrados en dos o tres tomas al día. La dosis oral máxima recomendada es de 6 g/día.

**Niños que pesan menos de 40 kg**

De 40-90 mg/kg/día, dividida en dos o tres tomas. La dosis máxima recomendada es de 100 mg/kg/día.

El tratamiento por vía oral se debe continuar durante al menos 72 horas tras la obtención de respuesta clínica. Se recomienda realizar 7 días de tratamiento mínimo.

En el tratamiento de infecciones por *S. pyogenes* (estreptococos beta-hemolíticos Grupo A), la administración de este antibiótico debe prolongarse por un período mínimo de 10 días.

**Pacientes con insuficiencia renal**

Es posible que requieran ajuste de dosis.

### Instrucciones para preparar la suspensión

Agite el envase con polvo en seco para desmenuarlo de las paredes.

Coloque agua previamente hervida, a temperatura ambiente, hasta la marca indicada en el frasco.

Tape y agite bien hasta que el polvo se mezcle con el agua.

Complete con agua hasta alcanzar nuevamente el nivel de la marca.

Verifique que la mezcla haya alcanzado la marca.

La suspensión una vez preparada, debe volver a agitarse antes de cada toma, asegurándose que no quede residuo sólido en el fondo del frasco. Luego de preparada la suspensión puede conservarse 14 días a temperatura ambiente entre 15 °C y 25 °C o 14 días en refrigerador entre +2 °C y +8 °C.

### Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos este medicamento puede producir efectos adversos.

**Deje de tomar Amoxidal y vaya a ver a un médico inmediatamente si sufre cualquiera de los siguientes efectos adversos graves - puede necesitar tratamiento médico urgente:**

Los siguientes efectos adversos son muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas):

- reacciones alérgicas, los signos pueden incluir: picazón de la piel o erupción, hinchazón de la cara, labios, lengua, cuerpo o dificultades para respirar. Estos pueden ser graves y, en algunas ocasiones, se han producido muertes
- erupción en la piel o puntos redondos rojos planos como la punta de un afilador bajo la superficie de la piel o moretones en la piel. Esto es debido a la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos

1106307840



ROEMMERS

hM Digital

FORMATO  
210x145

SOPORTE  
PAP

ACTUALIZACIÓN  
05/06/18

APROBACIÓN  
05/06/18

PLEGADO  
1º) 210 mm al medio

1 Tinta Pantone Negro

NEGRO

2º) 105 mm en tres partes iguales

- debido a una reacción alérgica. Puede estar asociada a dolor de las articulaciones (artritis) y a problemas en los riñones
- puede aparecer una reacción alérgica retrasada al cabo de 7 a 12 días tras tomar **Amoxidal**, algunos signos incluyen: erupciones, fiebre, dolor de las articulaciones y agrandamiento de los nódulos linfáticos especialmente bajo los brazos
  - 'eritema multiforme' - una reacción de la piel en la que puede desarrollarse: ronchas moradas o rojizas con picazón en la piel, especialmente en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, áreas hinchadas abultadas en la piel, tejidos blandos en la superficie de la boca, ojos y genitales. Puede tener fiebre y estar muy cansado
  - otras reacciones cutáneas graves pueden ser: cambios en el color de la piel, bultos bajo la piel, ampollas, pústulas, descamación, enrojecimiento, dolor, picazón, exfoliación. Estas pueden estar asociadas a fiebre, dolor de cabeza y dolor corporal
  - síntomas de tipo gripal con erupción cutánea, fiebre, inflamación de glándulas y resultados anormales en los análisis de sangre (como aumento de los leucocitos (eosinofilia) y elevación de las enzimas hepáticas (reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS)).
  - fiebre, escalofríos, dolor de garganta u otros signos de infección, o aparición de moretones con facilidad. Estos pueden ser signos de un problema con sus células de la sangre
  - reacción de Jarisch-Herxheimer que ocurre durante el tratamiento con amoxicilina para la enfermedad de Lyme y causa fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y erupción en la piel
  - inflamación del intestino grueso con diarrea (algunas veces con sangre), dolor y fiebre
  - pueden aparecer efectos adversos graves en el hígado. Estos están asociados principalmente a pacientes con tratamientos prolongados, a hombres y a la edad avanzada. Debe avisar a su médico inmediatamente si tiene:
    - diarrea grave con sangrado
    - ampollas, enrojecimiento o moretones en la piel
    - orina oscura o heces pálidas
    - la piel y el blanco de los ojos de color amarillento (ictericia).

Estos pueden ocurrir durante el tratamiento o hasta varias semanas después.

Si cualquiera de los anteriores síntomas aparece deje de tomar el medicamento y vaya a ver a su médico inmediatamente.

Algunas veces puede sufrir reacciones cutáneas menos graves como:

- una erupción moderada con picazón (ronchas redondas, de color rosado - rojo), áreas hinchadas con aspecto de ampollas en antebrazos, piernas, palmas, manos o pies. Esto es poco frecuente (puede afectar hasta 1 de cada 100 personas).

Si tiene cualquiera de ellos hable con su médico dado que tendrá que interrumpir su tratamiento con **Amoxidal**.

Otros posibles efectos adversos son:

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): erupción cutánea, náuseas, diarrea.

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): vómitos.

Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas): candidiasis (infección por hongos en la vagina, boca o pliegues de la piel), puede obtener tratamiento de su médico para la candidiasis; problemas de riñón, convulsiones (observadas en pacientes tratados con dosis altas o con problemas de riñón), mareos, hiperactividad, cristales en la orina (que pueden aparecer como orina turbia o dificultad o molestias al orinar. Asegúrese de beber mucho líquido para reducir la posibilidad de estos síntomas), alteración en la coloración de los dientes, que normalmente desaparece con el cepillado (esto se ha notificado en niños), la lengua puede cambiar de color a amarillo, marrón o negro y puede tener aspecto piloso, rotura excesiva de glóbulos rojos que provoca un tipo de anemia (los signos incluyen: cansancio, dolor de cabeza, dificultad para respirar, mareos, palidez y coloración amarillenta de la piel y del blanco de los ojos), bajo número de glóbulos blancos, bajo número de células implicadas en la coagulación de la sangre, la sangre puede tardar más de lo normal en coagular.

Uso de **Amoxidal** con otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento.

- Si toma alopurinol (usado para la gota) con Amoxicilina, es más probable que sufra una reacción alérgica en la piel
- Si está tomando probenecid (usado para la gota), su médico puede que le ajuste la dosis de **Amoxidal**
- Si toma anticoagulantes (como la warfarina) con amoxicilina pueden ser necesarios más análisis de sangre

1106307840-05/06/18

- Si está tomando otros antibióticos (como tetraciclina) **Amoxidal** puede ser menos eficaz
- Si está tomando metotrexato (usado para el tratamiento del cáncer y psoriasis severa) **Amoxidal** puede producir un aumento en los efectos adversos
- **Amoxidal** puede reducir la eficacia de los anticonceptivos orales.

**Toma de Amoxidal con los alimentos y bebidas**

**Amoxidal** puede administrarse indistintamente con o sin alimentos, ya que su absorción apenas es interferida por la presencia de alimentos en el aparato digestivo..

**Si toma más Amoxidal de lo que debe**

Es poco probable que se produzcan casos de sobredosificación con **Amoxidal**. Si se produjesen, podrían observarse síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos y diarreas, que deben tratarse sintomáticamente prestando atención al equilibrio hidroelectrolítico.

**Amoxidal** se puede eliminar de la circulación mediante hemodiálisis.

**Presentaciones**

**Amoxidal 250** suspensión pediátrica: Envases conteniendo frascos con polvo para preparar 60 mL.

**Amoxidal 500** comprimidos: Envases conteniendo 8, 16 y 200 comprimidos.

**Amoxidal 500** suspensión: Envases conteniendo frascos con polvo para preparar 70 mL; envases conteniendo frascos con polvo para preparar 150 mL con jeringa dosificadora.

**Amoxidal 750** comprimidos: Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos.

**Amoxidal 750** suspensión: Envases conteniendo frascos con polvo para preparar 50 mL; envases conteniendo frascos con polvo para preparar 100 mL con jeringa dosificadora.

**Amoxidal 875** comprimidos: Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos.

Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.  
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722

**Producto medicinal. Manténgase fuera del alcance de los niños**  
**Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C**

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: [www.cimlatam.com](http://www.cimlatam.com) o envíenos un correo electrónico a [contacto@cimlatam.com](mailto:contacto@cimlatam.com) o comuníquese directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

Industria Uruguaya  
Venta bajo receta profesional  
Elaborado en **ROEMMERS S.A.**  
Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay  
Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios  
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.  
[www.roemmers.com.uy](http://www.roemmers.com.uy)



1106307840

1106307840 Amoxidal



ROEMMERS

hM Digital

FORMATO  
210x145

SOPORTE  
PAP

ACTUALIZACIÓN  
05/06/18

APROBACIÓN  
05/06/18

PLEGADO  
1º) 210 mm al medio

1 Tinta Pantone Negro

2º) 105 mm en tres partes iguales

NEGRO

DPTO. DE DISEÑO - Consultas técnicas; (00598) 2705 7219 / [hmdigital@hmcreativos.com](mailto:hmdigital@hmcreativos.com)