

Corentel

Bisoprolol fumarato

Vía oral

Comprimidos recubiertos

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.

Conservar este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.

Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmulas

Corentel 5: Cada comprimido recubierto contiene: bisoprolol fumarato 5 mg; Exc. c.s.

Corentel 10: Cada comprimido recubierto contiene: bisoprolol fumarato 10 mg; Exc. c.s.

¿Qué es Corentel y para qué se utiliza?

Corentel contiene bisoprolol. El bisoprolol pertenece a un grupo de medicamentos llamados beta-bloqueantes. Estos medicamentos actúan afectando a la respuesta del organismo a algunos impulsos nerviosos, especialmente en el corazón. Como resultado, el bisoprolol entorpece el latido del corazón y hace que el corazón sea más eficaz al bombear la sangre por todo el organismo. Al mismo tiempo, el bisoprolol reduce la demanda de oxígeno y el suministro de sangre del corazón. Cuando el músculo cardíaco es débil e incapaz de bombear suficiente sangre para atender a las necesidades del organismo ocurre la insuficiencia cardíaca.

Corentel se utiliza para

- tratar la presión arterial elevada (hipertensión)
- tratar la angina de pecho
- tratar la insuficiencia cardíaca crónica estable
- Se utiliza en combinación con otros medicamentos adecuados para esta afección (como los inhibidores de la ECA, los diuréticos y glucósidos cardíacos).

No tome Corentel si:

- es alérgico al principio activo o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento
- padece asma grave
- tiene problemas circulatorios graves en las extremidades (como el síndrome de Raynaud), que puede producir hormigueos en los dedos de manos y pies o volverlos pálidos o azules
- tiene feocromocitoma no tratado (un tumor raro de la glándula adrenal)
- presenta acidosis metabólica

1109304840-20/10/17

- si tiene uno de los siguientes problemas del corazón:

- insuficiencia cardíaca aguda
- empeoramiento de la insuficiencia cardíaca que requiera la inyección intravenosa de medicamentos, que aumenten la fuerza de contracción del corazón
- presión arterial baja
- determinadas afecciones cardíacas que producen una frecuencia cardíaca muy lenta o pulso irregular
- shock cardiogénico

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico antes de empezar a tomar **Corentel**.

Si presenta alguna de las siguientes condiciones consulte a su médico antes de tomar **Corentel** su médico puede querer tomar precauciones especiales (por ejemplo proporcionar tratamiento adicional o realizar exámenes más frecuentemente):

- diabetes
 - ayuno estricto
 - determinadas enfermedades del corazón tales como trastornos del ritmo cardíaco, o dolor en el pecho grave en reposo (angina de Prinzmetal)
 - problemas del riñón o del hígado
 - problemas circulatorios menos graves en sus extremidades
 - asma menos grave o enfermedad pulmonar crónica
 - antecedentes de erupción cutánea escamosa (psoriasis)
 - feocromocitoma
 - alteraciones tiroideas
 - bloqueo cardíaco de primer grado
- Además, informe a su médico si va a recibir:
- tratamiento de desensibilización (por ejemplo para la prevención de la fiebre del heno)
 - anestesia (por ejemplo para cirugía)

Embarazo y lactancia

Existe el riesgo de que la utilización de **Corentel** durante el embarazo pueda dañar al bebé. Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Su médico decidirá si usted puede tomar **Corentel** durante el embarazo. Se desconoce si el bisoprolol pasa a la leche materna humana. Por lo tanto, no se recomienda la lactancia durante el tratamiento con **Corentel**.

Niños y adolescentes

Corentel no está recomendado para uso en niños y adolescentes.

Conducción y uso de máquinas

Su capacidad para conducir o utilizar maquinaria puede verse afectada dependiendo de lo bien que tolere el medicamento. Sea especialmente cauto al inicio del tratamiento, cuando la dosis se aumenta o la medicación se modifica, y también en combinación con el alcohol.

Uso de otros medicamentos

Comuníquese a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

No tome los siguientes medicamentos con **Corentel** sin consejo especial de su médico:

- antiarrítmicos de Clase I como la quinidina, disopiramida, lidocaina, fenitoina; flecaína, propafenona
 - antagonistas del calcio como verapamilo y diltiazem
 - clonidina, metildopa, moxonodina, rilmenidina. Sin embargo, no deje de tomar estos medicamentos sin consultarlo primero con su médico.
- Consulte con su médico antes de tomar los siguientes medicamentos con **Corentel**, puede que su médico necesite controlar su estado más frecuentemente:
- antagonistas del calcio del tipo de la dihidropiridina como el nifedipino, el felodipino y el amlodipino
 - antiarrítmicos de Clase III como la amiodarona
 - beta-bloqueantes aplicados localmente (como gotas oculares de timolol para el tratamiento del glaucoma)
 - determinados medicamentos utilizados para tratar, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer o para el tratamiento del glaucoma (parasimpaticomiméticos como la tacrina o el carbacol) o medicamentos que se utilizan para tratar problemas cardíacos agudos (simpaticomiméticos como la isoprenalina y dobutamina)

1109304840



ROEMMERS

hM Digital

1109304840 Corentel

FORMATO

160x130

SOPORTE

PAP

PLEGADO

SIN PLEGAR

ACTUALIZACIÓN

03/05/18

APROBACIÓN

03/05/18

1 Tinta Pantone Negro

NEGRO

DPTO. DE DISEÑO - Consultas técnicas; (00598) 2705 7219 / hmdigital@hmcreativos.com

- medicamentos antidiabéticos incluyendo la insulina
- agentes anestésicos (por ejemplo durante la cirugía)
- digitales
- antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) utilizados para el tratamiento de la artritis, el dolor o la inflamación (por ejemplo, ibuprofeno o diclofenaco)
- cualquier medicamento que pueda disminuir la presión arterial como efecto deseado o no deseado, como los antihipertensivos, antidepressivos tricíclicos como imipramina o amitriptilina, barbitúricos como el fenobarbital, o fenotiazinas como la levomepromazina
- mefloquina, utilizada para la prevención o el tratamiento de la malaria
- inhibidores de la monoaminooxidasa (excepto los inhibidores de MAO-B) como la moclobemida
- moxisilato, que se utiliza para tratar problemas circulatorios como el síndrome de Raynaud

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren. Para prevenir reacciones adversas graves, hable con un médico inmediatamente si un efecto adverso es grave, se produce de repente o empeora rápidamente.

Los efectos adversos más graves están relacionados con la función cardíaca: ralentización de la frecuencia cardíaca; empeoramiento de la insuficiencia cardíaca; latidos cardíacos lentos o irregulares

Si se siente mareado o débil, o tiene dificultades para respirar, póngase en contacto con su médico tan pronto como sea posible.

Otros efectos adversos son:

Frecuentes: cansancio, debilidad, mareos, dolor de cabeza, sensación de frío o entumecimiento en manos o pies, presión arterial baja, problemas del estómago o intestinales tales como náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento.

Poco frecuentes: alteraciones del sueño, depresión, mareos al estar de pie, problemas respiratorios en pacientes con asma o enfermedad respiratoria crónica, debilidad muscular, calambres musculares.

Raros: problemas de audición, goteo nasal, disminución de la producción de lágrimas (sequedad de ojos), inflamación del hígado que puede producir color amarillento de la piel o del blanco de los ojos, resultados de análisis de sangre para la función hepática o los niveles de grasa alterados, reacciones similares a las de tipo alérgico tales como picazón, enrojecimiento, erupción cutánea, problemas de erección, pesadillas, alucinaciones, desmayos.

Muy raros: irritación y enrojecimiento de los ojos (conjuntivitis), pérdida del cabello, aparición o empeoramiento de erupción cutánea escamosa (psoriasis); erupción similar a la psoriasis.

Cómo tomar Corentel

Siga exactamente las instrucciones de administración de **Corentel** indicadas por su médico. Consulte a su médico si tiene dudas.

Tome el comprimido con un poco de agua por la mañana, con o sin alimentos. No triture ni mastique el comprimido.

El tratamiento con **Corentel** requiere una vigilancia regular por su médico. Esto es particularmente necesario al inicio del tratamiento, durante el aumento de la dosis y en el cese del tratamiento. El tratamiento con **Corentel** es habitualmente a largo plazo.

Hipertensión y angina de pecho

Adultos, incluyendo pacientes de edad avanzada

La dosis debe ajustarse individualmente. La dosis diaria habitual es de 10 mg de bisoprolol. Dependiendo de lo bien que tolere el medicamento, su médico puede decidir reducir la dosis a 5 mg o puede decidir aumentarla a 20 mg. La dosis no debe superar los 20 mg al día.

Insuficiencia cardíaca crónica estable

Adultos, incluyendo pacientes de edad avanzada

El tratamiento con bisoprolol se debe iniciar a una dosis baja e incrementarla gradualmente. Su médico decidirá cómo aumentar la dosis, y esto se realizará normalmente del siguiente modo:

- 1,25 mg de bisoprolol una vez al día durante una semana
- 2,5 mg de bisoprolol una vez al día durante una semana
- 3,75 mg de bisoprolol una vez al día durante una semana
- 5 mg de bisoprolol una vez al día durante cuatro semanas
- 7,5 mg de bisoprolol una vez al día durante cuatro semanas
- 10 mg de bisoprolol una vez al día como terapia de mantenimiento (continua).

La dosis máxima diaria recomendada es de 10 mg de bisoprolol. Dependiendo de lo bien que tolere el medicamento, su médico puede decidir también prolongar el tiempo entre aumentos de dosis. Si su estado

empeora o ya no tolera el medicamento, puede ser necesario reducir de nuevo la dosis o interrumpir el tratamiento. En algunos pacientes, una dosis de mantenimiento inferior a 10 mg de bisoprolol puede ser suficiente. Su médico le dirá qué hacer.

Normalmente, si tiene que interrumpir el tratamiento por completo, su médico le aconsejará que reduzca la dosis de forma gradual, puesto que de otro modo su estado puede empeorar.

Uso en pacientes con insuficiencia renal y/o hepática

Normalmente no se requiere ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia de la función renal o hepática leve a moderada. En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < 20 ml/min) y en pacientes con insuficiencia hepática grave se recomienda no exceder 10 mg de bisoprolol una vez al día.

Si olvidó tomar Corentel

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tome su dosis habitual a la mañana siguiente.

Si toma más Corentel del que debe

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

Los síntomas de una sobredosis pueden incluir una reducción de la frecuencia cardíaca, dificultad grave para respirar, sensación de mareo, o temblores (debido a la disminución de azúcar en sangre).

Presentaciones

Corentel 5: Envases conteniendo 20 y 30 comprimidos recubiertos.

Corentel 10: Envases conteniendo 20 y 30 comprimidos recubiertos.

Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud

Producto medicinal

Manténgase fuera del alcance de los niños

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: www.cimatam.com o envíenos un correo electrónico a contacto@ciamatam.com o comuníquese directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722

Industria Uruguaya

Venta bajo receta profesional

Elaborado en **ROEMMERS S.A.** Uruguay

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios

☎ 0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

www.roemmers.com.uy



ROEMMERS
CONCIENCIA POR LA VIDA

1109304840-20/10/17

1109304840



ROEMMERS

hM Digital

1109304840 Corentel

FORMATO

160x130

SOPORTE

PAP

PLEGADO

SIN PLEGAR

ACTUALIZACIÓN

03/05/18

APROBACIÓN

03/05/18

1 Tinta Pantone Negro

NEGRO

DPTO. DE DISEÑO - Consultas técnicas; (00598) 2705 7219 / hmdigital@hmcreativos.com