

# Dorixina

## Clonixinato de Lisina

Vía tópica dérmica  
Gel

#### Fórmula

Cada 100 g de gel contiene: Clonixinato de Lisina 5,00 g; Exc.: Isopropanol; Hidroxiethylcelulosa; Carbomero 940; Propilenglicol (Uso oral); Sulfito de sodio; Solución de Lisina base al 50%; Edetato disódico dihidrato; Metilparabeno ácido; Mentol cristal; Esencia; Azul brillante FD&C N°1; Agua destilada c.s.

#### Acción farmacológica

**Dorixina** es un analgésico y antiinflamatorio no esteroide (AINE) con efecto analgésico predominante. Su acción se desarrolla especialmente por inhibición de la síntesis de las prostaglandinas mediadoras del dolor y de la inflamación, ya que inhibe a la enzima ciclooxigenasa 2 (COX-2) en forma predominante. **Dorixina** tiene menor actividad sobre la enzima ciclooxigenasa 1 (COX-1) que interviene en la síntesis de las prostaglandinas fisiológicas de la mucosa gastrointestinal y renal, donde estas ejercen una función protectora. **Dorixina** gel es un analgésico, antiinflamatorio de uso tópico.

#### Indicaciones

**Dorixina** gel está indicado en el tratamiento sintomático de:

- 1) Los cuadros dolorosos e inflamatorios de origen traumático de los ligamentos, los músculos, los tendones y las articulaciones (contusiones, distensiones, esguinces, entorsis).
- 2) Las enfermedades reumáticas localizadas (osteoartritis, artritis).
- 3) Las formas localizadas de los reumatismos extraarticulares (tenosinovitis, bursitis, periartropatías).

#### Contraindicaciones

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad reconocida al Clonixinato de Lisina o con antecedentes de broncoespasmo, pólipos nasales, angioedema o urticaria ocasionados por la administración de ácido acetilsalicílico (aspirina) u otros antiinflamatorios no esteroideos. No aplicar en contusiones con solución de continuidad o sobre mucosas, heridas, úlceras, eczemas o cicatrices recientes.

#### Precauciones

Se suspenderá el tratamiento con **Dorixina** gel consultando al médico, si se presentaran reacciones alérgicas en la piel y/o mucosas. Si el gel ha sido aplicado con las manos, deberán ser lavadas luego de la aplicación. No tocar los ojos o párpados sin haber realizado el lavado.

#### Embarazo y lactancia

No existe suficiente información del uso de **Dorixina** gel en embarazo y lactancia. Antes de utilizar consulte al médico.

#### Población pediátrica

No existe suficiente información del uso de **Dorixina** gel en niños menores de 12 años. Antes de utilizar consulte al médico.

1116910840-02/05/18

1116910840

1116910840 Dorixina



HM Digital

FORMATO  
130x70

SOPORTE  
PAP

ACTUALIZACIÓN  
02/05/18

APROBACIÓN  
02/05/18

PLEGADO  
70 mm en 3



1 Tinta Pantone Negro

NEGRO

**Incompatibilidades**

No asociar con otros fármacos de empleo tópico sobre la misma lesión.

**Interacciones con otros medicamentos y alimentos**

Dado que los perfiles plasmáticos de **Dorixina gel** se mantienen por debajo de los límites de detección (50 mg) no desarrolla interacciones con otros fármacos.

**Reacciones adversas**

Generalmente es muy bien tolerado. Excepcionalmente y en individuos muy sensibles puede presentarse calor, rubor o ardor en la zona de aplicación.

**Advertencias**

Ver precauciones.

**Dosis y vía de administración**

Aplicar **Dorixina gel** sobre la zona lesionada o dolorosa en cantidad suficiente (aproximadamente 2 cm de gel, equivalente a 22,5 mg de Clonixinato de Lisina), 3 ó 4 veces por día de acuerdo con la intensidad del dolor. Espaciar el gel con un suave masaje hasta lograr su absorción completa.

**Tratamiento en caso de sobredosis**

No se han informado casos de sobredosis con **Dorixina gel**. En caso de ingestión accidental, luego de una cuidadosa evaluación clínica del paciente, de la valoración del tiempo transcurrido desde la ingesta, de la cantidad de droga ingerida y descartando la contraindicación de ciertos procedimientos, el médico decidirá la realización o no del tratamiento de rescate y sintomático de soporte. No se han descrito antídotos específicos.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico.

**Presentación**

**Dorixina gel** 5%. Envases conteniendo un tubo de 50 g.

**Producto medicinal. Manténgase fuera del alcance de los niños**  
**Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C**

Industria Uruguaya

Elaborado en **ROEMMERS S.A.**

Cno. Maldonado 5634, Montevideo, Uruguay

**Centro América:** Distribuido e importado por **Roemmers de Centro América, S.A.**, Guatemala.

**Ecuador:** Conservar a temperatura no mayor a 30 °C

Importado y distribuido por **Roemmers S.A.**, Quito - Ecuador. Producto de uso delicado. Adminístrese por

prescripción y bajo vigilancia médica. Venta bajo receta médica

**Paraguay:** Representado en Paraguay por **Lab. ROEMMERS S.A.C.I.**

Pitiantuta 613 esq. Juan de Salazar. Teléfono: 210779

Regente: Q.F. María R. Irala. Reg. Prof.: N° 1406

Venta autorizada por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certificado N° 19450-01-EF

**Perú:** Importado por **DROGUERIA LABORATORIOS ROEMMERS S.A.**

Jr. Faustino Sánchez Carrón 425, Lima 17 - Perú

D.T. Q.F. Carmen Izaguirre Uribe. Expendio bajo receta médica

**Rep. Dominicana:** para **ROEMMERS S.R.L.**, Rep. Dominicana

**Uruguay:** Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro laboratorio, para

los profesionales de la salud

**Nota:** Todo medicamento es potencialmente tóxico

En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722

Venta libre en condiciones reglamentarias.

Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas, consulte a su médico.

Información a profesionales y usuarios 0800 - 3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: [www.cimlatam.com](http://www.cimlatam.com) o envíenos un correo electrónico a [contacto@cimlatam.com](mailto:contacto@cimlatam.com) o comuníquese directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.



**ROEMMERS**  
CONCIENCIA POR LA VIDA

1116910840-02/05/18

**1116910840**

**1116910840 Dorixina**



**ROEMMERS**

hM Digital

FORMATO

**130x70**

SOPORTE

**PAP**

ACTUALIZACIÓN

**02/05/18**

APROBACIÓN

**02/05/18**

PLEGADO

**70 mm en 3**



**1 Tinta Pantone Negro**

**NEGRO**