

# Dorixina Relax

Clonixinato de Lisina 125 mg  
Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg

Vía oral

Comprimidos recubiertos

#### Fórmula

Cada comprimido recubierto contiene: Clonixinato de Lisina 125 mg; Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg; Exc. c.s.

#### Acción terapéutica

**Dorixina Relax**, es la asociación de un relajante muscular de acción central, la Ciclobenzaprina y un analgésico no narcótico, el Clonixinato de lisina.

#### Indicaciones

**Dorixina Relax**, está indicada en todos aquellos cuadros en los que coexisten contractura muscular y dolor: mialgias tensionales y ocupacionales, periartritis escapulo humeral (hombro doloroso), espondiloartrosis, dolor y contractura que acompañan a la patología discal y la osteoporosis.

En todos estos cuadros, la Ciclobenzaprina relaja los músculos contracturados, y el Clonixinato de lisina, alivia el dolor, devolviendo la funcionalidad.

#### Posología

Como dosis promedio se aconseja 1 comprimido cada 8 horas, ingerido sin masticar, y con abundante líquido.

El período de tratamiento con ciclobenzaprina no debe ser superior a 3 semanas. Dosis máxima recomendada por día: 6 comprimidos.

1173902840-30/10/17

#### Contraindicaciones

**Dorixina Relax**, está contraindicada en pacientes con conocida hipersensibilidad al Clonixinato de lisina o a la Ciclobenzaprina. Si se están administrando antidepresivos IMAO, éstos deben ser suspendidos por lo menos dos semanas antes de administrar **Dorixina Relax**. El hipertiroidismo, las arritmias, los trastornos de la conducción cardíaca y la úlcera gastroduodenal en actividad, también son contraindicaciones formales para su utilización. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

#### Acciones colaterales

A las dosis aconsejadas, los secundarismos son muy poco frecuentes; se han descrito algunos casos de sequedad de boca, vértigo y epigastralgia.

#### Precauciones y advertencias

A pesar de no haberse comprobado experimentalmente efecto alguno sobre la gestación, no se aconseja su uso durante el embarazo.

Se recomienda usar **Dorixina Relax** con precaución en pacientes ulcerosos o con antecedentes de dicha patología, glaucoma, retención urinaria o en aquellos que estén recibiendo medicamentos anticolinérgicos, barbitúricos u otros depresores del sistema nervioso central.

En pacientes especialmente susceptibles que presenten somnolencia al inicio del tratamiento se aconseja especial precaución si deben conducir vehículos o manejar máquinas que requieran atención.

Debe utilizarse con extrema precaución en pacientes con insuficiencia hepática moderada o severa, debido a que aumentan los niveles plasmáticos de la ciclobenzaprina.

#### Embarazo y Lactancia

**Embarazo.** No debe utilizarse clonixinato de lisina durante el primer y el segundo trimestre. Clonixinato de lisina está contraindicado durante el tercer trimestre. **Lactancia.** El clonixinato de lisina se elimina por la leche materna. Se desconoce si ciclobenzaprina se elimina por leche materna. No se recomienda la administración de **Dorixina Relax** durante la lactancia.

#### Interacciones medicamentosas

*Con clonixinato de lisina*

- Ticlopidina, heparina, administrados por vía sistémica y trombolíticos: el tratamientos con AINEs puede aumentar el riesgo de hemorragia.
- Fármacos antihipertensivos (por ejemplo beta-bloqueantes, inhibidores de la ECA, vasodilatadores, diuréticos): puede disminuir la eficacia hipertensiva por inhibición de las prostaglandinas vasodilatadoras durante el tratamiento simultáneo con AINEs.

**DORIXINA RELAX - 11 739 02 840**

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOORTE	SIN PLEGAR
1173902840	160x130	30/10/17	30/10/17	PAP	

Diseño Gráfico hM Creativos  
**NEGRO**

- Fármacos diuréticos: en pacientes deshidratados, el tratamiento con AINEs aumenta el riesgo potencial de insuficiencia renal aguda.
- Sales de litio: Los AINEs en general aumentan los niveles plasmáticos de litio. Se controlará la concentración plasmática de litio al comenzar, modificar o suspender la administración de clonixino lisina.
- Glucocorticoides, otros antiinflamatorios no esteroideos (incluyendo ácido acetilsalicílico) y alcohol: aumento del riesgo de úlcera gastroduodenal y hemorragias por acción sinérgica.
- Metotrexato: aunque no se ha descrito caso alguno durante la terapia con clonixino lisina, existen estudios con otros AINEs (ibuprofeno, fubiprofeno, ketoprofeno, naproxeno, piroxicam) en los que se ha registrado posible acumulación de ambos fármacos con potenciación de la toxicidad, por competitividad por el mecanismo de excreción renal.

**Con ciclobenzaprina**

Puede aumentar el riesgo de crisis hipertensivas o convulsiones graves si se toma concomitantemente con:

- Antiparkinsonianos, inhibidores de la MAO B (rasagilina, selegilina)
- Antidepresivos, inhibidores de la MAO A (tranilcipromina, moclobemida)
- Analgésicos (tramadol).
- Antibacterianos (linezolid).

La ciclobenzaprina está relacionada estructuralmente con los antidepresivos tricíclicos, los cuales prolongan el intervalo QT.

No se recomienda el uso simultáneo con medicamentos que también prolonguen el intervalo QT, como:

- Antiarrítmicos (dronedarona, amiodarona, disopiramida, flecainida, ranolazina), antianginosos (ivabradina) y betabloqueantes (sotalol).
- Antineoplásicos (tríoxido de arsénico, lapatinib, nilotinib, pazopanib, sunitinib, vemurafenib, vinflunina).
- Antibióticos macrólidos (claritromicina, eritromicina, telitromicina), quinolonas (levofloxacino, moxifloxacino).
- Antifúngicos (fluconazol, voriconazol).
- Antipsicóticos (pimozida, asenapina, clozapina, droperidol, paliperidona, ziprasidona).
- Antidepresivos (fluoxetina).
- Otros medicamentos que actúan en el SNC (metadona, tetrabenazina, pasireotida).
- Medicamentos que contengan fosfato de sodio.
- Antiasmáticos (formoterol).
- Antimaláricos (lumefantrina).

La administración conjunta con los siguientes medicamentos puede aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico:

- Antineoplásicos (procarbazina).
- Antimigrañosos (amitriptan).

1173902840-30/10/17

- Antidepresivos (duloxetina, hidroxitriptófano, trazodona, desvenlafaxina, escitalopram).

La ciclobenzaprina puede disminuir el efecto antihipertensivo de la guanetidina. La ciclobenzaprina puede aumentar el efecto depresor del alcohol y de otros depresores del SNC.

**Presentación**

Envases conteniendo 10 comprimidos recubiertos.

Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico. En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.

**Producto medicinal**

**Manténgase fuera del alcance de los niños**

**Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C**

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: [www.cimlatam.com](http://www.cimlatam.com) o envíenos un correo electrónico a [contacto@cimlatam.com](mailto:contacto@cimlatam.com). Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

Industria Uruguaya

Control médico recomendado

Elaborado en **ROEMMERS S.A.**

Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios

0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

[www.roemmers.com.uy](http://www.roemmers.com.uy)



**ROEMMERS**  
CONCIENCIA POR LA VIDA

**DORIXINA RELAX - 11 739 02 840**

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	SIN PLEGAR
1173902840	160x130	30/10/17	30/10/17	PAP	

**Diseño Gráfico hM Creativos**

**NEGRO**