

DorixinaFast

Clonixinato de Lisina 125 mg

Vía oral
Cápsulas

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmula

DorixinaFast cápsulas: Cada cápsula contiene: Clonixinato de Lisina 125 mg; Exc. c.s.

¿Qué es DorixinaFast y para qué se utiliza?

DorixinaFast es un antiinflamatorio no esteroideo, medicamento eficaz para reducir el dolor, con propiedades antiinflamatorias además de analgésicas.

La avanzada tecnología de las cápsulas de **DorixinaFast**, permite la rapidez de acción consiguiendo su efecto analgésico aproximadamente a los 5 minutos luego de la ingesta.

DorixinaFast está indicada en todos los cuadros dolorosos cualquiera sea su origen, localización e intensidad, como por ejemplo dolores: de cabeza, musculares, articulares, menstruales, traumáticos (esguinces, golpes, torceduras), post-quirúrgicos, de oído, dentales, viscerales, etc.

No tome este medicamento si:

- Es alérgico (hipersensible) al Clonixinato de lisina.
- Padece úlcera activa de estómago.
- Tiene tendencia a padecer hemorragias digestivas.
- Padece trastornos de formación de las células sanguíneas, en especial las plaquetas.
- Padece insuficiencia renal severa.
- En niños menores de 12 años, debido a que existe poca experiencia publicada de su utilización en este grupo etario. En este caso aconsejamos la consulta con el médico.
- Está embarazada o en periodo de lactancia.

Advertencias

Se suspenderá el tratamiento con **DorixinaFast** previa consulta al médico, si se presentaran reacciones alérgicas en la piel y/o mucosas o síntomas de úlcera péptica o de hemorragia gastrointestinal.

2016917840-31/08/17

Tenga precaución si:

- Tiene antecedentes de alteraciones gastrointestinales, úlceras de estómago o enfermedad inflamatoria del intestino, especialmente si utiliza Clonixinato de lisina a dosis altas (más de 6 cápsulas al día).
- Padece alteración de la función del riñón leve a moderada. Aunque no se ha descrito caso alguno durante la administración de Clonixinato de lisina, es sabido que los antiinflamatorios no esteroideos en general, inhiben la síntesis de prostaglandinas que promueven la irrigación renal. En enfermos cuya perfusión renal se encuentra disminuida, la administración de estos fármacos puede precipitar una descompensación de la función renal, generalmente reversible al interrumpir el tratamiento con el fármaco en cuestión.
- Padece algún trastorno del corazón (insuficiencia cardíaca congestiva).
- Tiene antecedentes de ataques de asma, de broncoespasmo rinitis agudas, pólipos nasales, así como erupciones de la piel, angioedema o urticaria ocasionados por la administración de ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos.
- Padece alteración de la función del hígado.
- Consume antiinflamatorios no esteroideos a dosis muy altas.
- Como sucede con todos los antiinflamatorios administrar con precaución a los pacientes ancianos, ya que en los mismos puede existir alteración de la función renal, hepática o cardiovascular.

Consulte a su médico, incluso si cualquiera de las circunstancias anteriormente mencionadas le hubiera ocurrido alguna vez.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

Ciertos medicamentos pueden interactuar con **DorixinaFast**, en estos casos puede resultar necesario cambiar la dosis o interrumpir el tratamiento con alguno de los medicamentos, por lo que no deben utilizarse sin consultar al médico.

Esto es especialmente importante en el caso de:

- Ticlopidina, heparina y trombolíticos (medicamentos que impiden la formación de los coágulos en sangre) ya que aumentan el riesgo de una hemorragia. Si la administración concomitante es inevitable, se efectuarán controles estrictos de la coagulación sanguínea, ajustando las dosis de los medicamentos que la modifican de acuerdo a los resultados. Se ha demostrado que el Clonixinato lisina administrado en dosis terapéutica no afecta la farmacocinética y la actividad anticoagulante del fenprocumón.
- Sales de litio (se utilizan en el tratamiento de la depresión). Los AINEs en general aumentan los niveles plasmáticos de litio. Se controlará la concentración plasmática de litio al comenzar, modificar o suspender la administración de **DorixinaFast**.
- Antihipertensivos (medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la tensión alta, (por ejemplo beta-bloqueantes, inhibidores de la ECA, vasodilatadores, diuréticos): se ha comunicado una disminución de la eficacia hipertenso por inhibición de las prostaglandinas vasodilatadoras durante el tratamiento simultáneo con AINEs.
- Diuréticos (medicamentos que aumentan la secreción de orina, por ejemplo furosemida, espironolactona): en los pacientes deshidratados, el tratamiento con AINEs aumenta el riesgo potencial de insuficiencia renal aguda. En caso de tratamiento concomitante con diuréticos, se deberá hidratar adecuadamente a los pacientes y controlar la función renal antes de comenzar el mismo.
- Glucocorticoides (medicamentos utilizados en el tratamiento de la inflamación) y Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs): existe un aumento del riesgo de úlcera gastroduodenal y hemorragias por acción sinérgica.
- Metotrexato (utilizado para el tratamiento del cáncer y de la artritis reumatoide): aunque no se ha descrito caso alguno durante la terapia con clonixinato de lisina, existen estudios con otros AINEs (ibuprofeno, fubuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, piroxicam) en los que se ha registrado posible acumulación de ambos fármacos con potenciación de la toxicidad

DORIXINAFast - 2016917840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
2016917840	160x130	31/08/17	31/08/17	PAP	130 mm en 4

Diseño Gráfico HM Digital

Negro

hematológica, por competitividad por el mecanismo de excreción renal. En estos casos deben efectuarse controles hematológicos estrictos.

Toma de DorixinaFast con los alimentos y bebidas

No se debe tomar con alcohol ya que se potencia el riesgo de aparición de úlcera gastroduodenal. Debe tomario preferentemente con las comidas y con abundante líquido.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

Si bien los estudios en animales no han registrado teratogenicidad, no existe experiencia suficiente, por lo que no se aconseja su uso en mujeres embarazadas o amamantando, a no ser que el médico indique lo contrario.

Conducción y uso de máquinas

No se dispone de datos en los que se demuestre que el Clonixinato de lisina afecte desfavorablemente la capacidad de conducir o utilizar maquinaria. Sin embargo, en este aspecto, los pacientes deben ser conscientes de la posible presentación de mareos y somnolencia como efectos secundarios. Por tanto, procure no realizar tareas que puedan requerir una atención especial, hasta que sepa como tolera el medicamento.

¿Cómo tomar DorixinaFast?

DorixinaFast se administra por vía oral. Las cápsulas deben ingerirse enteras sin ser partidas ni masticadas, acompañadas de un vaso de líquido, preferiblemente agua. La administración se debe realizar conjuntamente con las comidas para reducir las posibles molestias estomacales.

Adultos y niños mayores de 12 años:

Salvo indicación médica, la dosis habitual para los adultos es de 1 ó 2 capsulas, de 3 a 4 veces por día a intervalos regulares, según la intensidad del dolor, con un máximo de 6 capsulas al día (750 mg por día).

Si toma más DorixinaFast de lo que debiera

Aún no se han informado casos de sobredosis con Clonixinato de lisina.

En caso de sobredosificación accidental o voluntaria consulte inmediatamente a la emergencia médica o comuníquese con el centro de toxicología de referencia, indicando el/los medicamento/s y la cantidad ingerida.

Si se sobrepasan las dosis recomendadas, pueden originarse: dolores de cabeza, vértigo, temblor así como dolor abdominal, náuseas y vómitos.

En caso de ingestión masiva, luego de una cuidadosa evaluación clínica, de la valoración del tiempo transcurrido desde la administración, de la cantidad de fármacos administrados y descartando la contraindicación de ciertos procedimientos, se decidirá la realización o no del tratamiento de rescate: evacuación gástrica (emesis o lavado gástrico con carbón activado), control clínico estricto (especialmente gastroduodenal y de la función renal) y tratamiento sintomático de soporte. No se han descrito antídotos específicos.

Si olvidó tomar DorixinaFast

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Posibles efectos adversos

A dosis terapéuticas DorixinaFast es un medicamento bien tolerado. Ocasionalmente y en individuos con cierta predisposición pueden presentarse: malestar, dolor de estómago, sensación de plenitud gástrica o acidez gástrica (que desaparecen habitualmente sin necesidad de suprimir el tratamiento), náuseas, vómitos, diarreas.

Otros trastornos muy raros: somnolencia, cansancio, vértigos, reacciones de hipersensibilidad (alergia), con rash cutáneo y prurito, ecema maculopapular, alteraciones de la piel, broncoespasmo y disnea.

Presentación

DorixinaFast cápsulas: Envases conteniendo 5 y 2 (Uruguay) y 10 cápsulas.

2016917840-31/08/17

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud.

Producto medicinal

Manténgase fuera del alcance de los niños

Conservar en lugar seco, a temperatura ambiente, inferior a 30 °C, protegido de la luz.

Industria Uruguaya

Expendio bajo receta médica

Elaborado en ROEMMERS S.A. Uruguay

Centro América: Distribuido e Importado por:

Roemmers de Centro América, S.A., Guatemala

Colombia: Importado y distribuido por Scandinavia Pharma Ltda.

Calle 106 Nº 18 A - 45. Bogotá D.C. - Colombia. PBX: 6461700

Ecuador: Producto de uso delicado

Adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica

Paraguay: Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse a Emergencias Médicas, Dpto. de Toxicología, Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelos, Teléf. 220418.

Representado en Paraguay por Lab. ROEMMERS S.A.C.I.

Pitiantuta 613 esq. Juan de Salazar. Teléfono: 210779

Regente: Q.F.: María R. Irala. Reg. Prof.: Nº 1406

Venta autorizada por la Dirección de Vigilancia Sanitaria

del M.S.P. y B.S. Certificado Nº 18590-01-EF

Perú: Importado por: DROGUERIA LABORATORIOS ROEMMERS S.A.

Jr. Faustino Sánchez Carrión 425, Lima 17 - Perú

D.T. Q.F.: Carmen Izaguirre Uribe. R.U.C. 20100134617

Rep. Dominicana: para ROEMMERS S.R.L.

Rep. Dominicana

Uruguay: Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C

Control médico recomendado

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico

En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722

Información a profesionales y usuarios

0800 - 3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación, póngase en contacto con nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com

O envíenos un correo a contacto@cimlatam.com

Toda comunicación a través de este sitio es confidencial y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

Venezuela: Importado y distribuido por LABORATORIOS KLINOS C.A., Caracas, Venezuela.

Tlf: (212) 700-76-93



ROEMMERS
CONCIENCIA POR LA VIDA

DORIXINAFast - 2016917840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
2016917840	160x130	31/08/17	31/08/17	PAP	130 mm en 4

Diseño Gráfico HM Digital

Negro

