

Clintopic Gel

Gel

Clorhidrato de clindamicina

Vía tópica dérmica

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmula

Cada 100 mL contiene: Clorhidrato de clindamicina 1 g; Exc. c.s.

¿Qué es Clintopic Gel y para qué se utiliza?

Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas como la gripe o el catarro. Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento indicadas por su médico.

Clintopic Gel contiene un antibiótico, clindamicina, que reduce el número de bacterias e impide que los poros de la piel se obstruyan y se formen nuevos granos. También ayuda a reducir el entorpecimiento de los granos que ya existen. Clintopic Gel está indicado en el tratamiento del acné vulgar, de gravedad leve o moderada, particularmente en la fase de lesiones inflamatorias, en adultos y adolescentes mayores de 12 años. Tratamiento de la Folliculitis.

No use Clintopic Gel

- Si es alérgico (hipersensible) a la clindamicina o a la lincomicina
- Si en el pasado ha padecido una colitis asociada al uso de antibióticos.
- Niños menores de 12 años.

Precauciones

- Este medicamento es para uso tópico, no se debe ingerir
- Durante el tratamiento con este medicamento o después de éste, pueden aparecer síntomas que sugieran colitis (diarrea) asociada a antibióticos. Si es así el tratamiento debe suspenderse y su médico le indicará el tratamiento que considere más adecuado.
- Enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis pseudomembranosa o la enfermedad de Crohn.
- Si está recibiendo otros antibióticos.
- Puede producir irritación cutánea. La capacidad de Clintopic Gel para producir irritación puede aumentar si el medicamento se utiliza en condiciones de oclusión.
- Debe evitarse el contacto de Clintopic Gel con los ojos y las membranas mucosas nasal y oral. En caso de contacto accidental con los ojos o las membranas mucosas, debe lavarse la zona afectada con abundante agua fría.
- La mejoría con el tratamiento con Clintopic Gel se observa entre las 6 – 8 semanas de tratamiento. La seguridad y eficacia de Clintopic Gel no se ha comprobado en tratamientos superiores a 12 semanas.
- Si usted ha sido diagnosticado de acné pápulo-pústular (un tipo de acné), su médico le indicará el tratamiento más adecuado.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

En estudios clínicos con mujeres embarazadas, la administración sistémica de clindamicina durante el segundo y el tercer trimestre no se ha asociado con un aumento de la frecuencia de anomalías congénitas. No existen estudios adecuados y bien controlados con mujeres embarazadas durante el primer trimestre con este medicamento. Este medicamento no debe utilizarse durante el primer trimestre de embarazo a no ser que la situación clínica de la mujer requiera tratamiento.

4829101840-22/05/18

4829101840



ROEMMERS

hM Digital

4829101840 Clintopic Gel

FORMATO

130x80

SOPORTE

PAP

ACTUALIZACIÓN

22/05/18

APROBACIÓN

06/07/18

PLEGADO

80 mm en 3



1 Tinta Pantone Negro

NEGRO

DPTO. DE DISEÑO - Consultas técnicas; (00598) 2705 7219 / hmdigital@hmcreativos.com

Se desconoce si clindamicina se excreta en la leche materna tras la administración por vía tópica. Sin embargo, si que se excreta en la leche materna tras la administración por vía oral o intravenosa. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre.

Conducción y uso de máquinas

La influencia de este medicamento sobre la capacidad de conducir o utilizar máquinas es nula o insignificante.

Información importante sobre algunos de los componentes de Clintopic Gel

Clintopic Gel puede producir irritación en la piel porque contiene proplilengico.

Uso de Clintopic Gel con otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Si está en tratamiento con bloqueantes neuromusculares (usados para producir parálisis en el músculo, tales como pancuronio, tubocurarina), comuníquesele a su médico, puesto que clindamicina puede potenciar la acción de estos medicamentos.

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, Clintopic Gel puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Los efectos adversos observados son:

Muy frecuentes: piel seca, irritación de la piel, lesiones de la piel rojizas, elevadas y con picazón (urticaria).

Frecuentes: piel grasa.

Poco frecuentes: Alteraciones gastrointestinales.

Frecuencia no conocida: foliculitis, sensación de pinchazos en los ojos, dolor en el abdomen, un tipo especial de colitis (pseudomembranosa), dermatitis de contacto

Cómo usar Clintopic Gel

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico.

Clintopic Gel es para uso cutáneo exclusivo.

Su médico establecerá la dosis y duración del tratamiento más adecuada para usted, de acuerdo a su estado y a la respuesta al tratamiento.

Adultos y niños mayores de 12 años

Aplique una capa fina de Clintopic Gel 1 o 2 veces por día sobre la zona afectada, sin masajear ni aplicar un vendaje oclusivo. Su médico valorará la evolución clínica, tras 6-8 semanas de tratamiento. Este medicamento debe ser usado durante un máximo de 12 semanas.

Aplíquelo con precaución para evitar el contacto del medicamento con los ojos, la nariz o la boca. El producto entra en contacto con los ojos, deben lavarse inmediatamente los ojos con agua abundante. Si continúa sintiendo una sensación de ardor o dolor en los ojos, consulte con su médico.

Si usa más Clintopic Gel del que debiera

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

No es de esperar que se produzcan casos de sobredosis con el uso normal del medicamento. Puede producirse dermatitis irritante cuando se aplican cantidades excesivas de Clintopic Gel.

No se han descrito casos de intoxicación si bien la clindamicina administrada típicamente puede absorberse en cantidad suficiente para producir efectos adversos. Los síntomas en caso de sobredosis son: náuseas, vómitos o diarrea.

Información para el profesional sanitario: En caso de sobredosis, la diálisis peritoneal o la hemodilísis no son efectivas para eliminar clindamicina del suero. Se puede realizar un lavado gástrico. Se recomienda el tratamiento con carbón activo y la implantación de tratamiento sintomático adecuado. En caso de que ocurra una reacción de tipo alérgico, debe aplicarse el tratamiento habitual de emergencia incluyendo corticosteroides, adrenalina y antihistamínicos.

Presentación

Envases conteniendo 30 mL.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.

En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.

Producto medicinal

Mantener fuera del alcance de los niños

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com o envíenos un correo electrónico a contacto@cimlatam.com o comuníquese directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

Venta bajo receta profesional
Industria Uruguay
Elaborado en ROEMMERS S.A.
Cno. Maldonado 5634. Montevideo, Uruguay

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy



4829101840-22/05/18

4829101840



ROEMMERS

hM Digital

4829101840 Clintopic Gel

FORMATO

130x80

SOPORTE

PAP

ACTUALIZACIÓN

22/05/18

APROBACIÓN

06/07/18

PLEGADO

80 mm en 3



1 Tinta Pantone Negro

NEGRO

DPTO. DE DISEÑO - Consultas técnicas; (00598) 2705 7219 / hmdigital@hmcreativos.com