

Eritroderm

Gel

Eritromicina

Vía de
administración
tópica dérmica
Uso externo

LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE ANTES DE COMENZAR EL TRATAMIENTO

Conservar este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dársele a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.

Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:

Eritromicina 2 g
Exc. c.s.

¿QUÉ ES Eritroderm Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Eritroderm es un medicamento que contiene eritromicina, un antibiótico macrólido de amplio espectro de acción. Es activo frente al *Propionibacterium acnes*

(*Corynebacterium acnes*) reduciendo las lesiones inflamatorias del acné vulgar

Eritroderm está indicado en el tratamiento tópico del acné vulgar.

NO USE Eritroderm Si:

Si es alérgico (hipersensible) a la eritromicina o a cualquiera de los demás componentes.

TENGA PRECAUCIÓN:

- **Eritroderm** es exclusivo para uso externo.
- Debe evitarse el contacto con mucosa ocular, nasal y/o bucal.
- En caso de contacto accidental con los ojos u otras mucosas sensibles, lavar con abundante agua.
- Si se presentase una reacción de hipersensibilidad, deberá suspenderse la aplicación del producto y tratarla con los medicamentos adecuados.
- Si ha tenido o eczema o enrojecimiento de la piel, rotura de vasos sanguíneos y pequeños granos normalmente en la zona central de la cara (rosácea) o enrojecimiento y dolor alrededor de la boca (dermatitis perioral) **Eritroderm** podría producir mayor irritación en estas condiciones.
- Debido a la naturaleza inflamable de **Eritroderm**, debe evitar fumar o estar cerca de llamas mientras se aplica **Eritroderm** e inmediatamente después de aplicarlo.
- El contenido de butilhidroxitolueno puede producir reacciones locales de piel e irritación de ojos y mucosas.
- No utilizar en menores de 12 años.

EMBARAZO Y LACTANCIA

No se ha establecido la inocuidad de su uso durante el embarazo ni en el período de lactancia. Se recomienda consultar médico tratante sobre su uso.

USOS DE OTROS MEDICAMENTOS

Aunque no ha sido demostrada interacción alguna, la posibilidad de un efecto irritante exige control al utilizar **Eritroderm** junto a otros medicamentos tópicos para el acné, particularmente los agentes abrasivos o queratolíticos.

Consulte a su médico si:

- está utilizando peróxido de benzoilo. Si lo utiliza al mismo tiempo, podría

4829301840-02/05/18

4829301840



ROEMMERS

hM Digital

4829301840 Eritroderm

FORMATO

130x80

SOPORTE

PAP

ACTUALIZACIÓN

02/05/18

APROBACIÓN

02/05/18

PLEGADO

80 mm en 3



1 Tinta Pantone Negro

NEGRO

reducir la eficacia de **Eritroderm**. Puede necesitar aplicarse estos medicamentos a diferentes horas del día.

- está utilizando cualquier otro medicamento para el acné. Si los utiliza al mismo tiempo, podría empeorar la irritación de la piel.

Si ha tomado o utilizado recientemente otros medicamentos que contienen eritromicina o clindamicina, existe un aumento en la posibilidad de que **Eritroderm** no actúe tan bien como debería.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

En raros casos se han descrito casos leves de eritema, prurito y sequedad de la piel, que no obligaron a suspender el tratamiento. La utilización de agentes antimicrobianos (especialmente en terapias prolongadas o repetidas) puede estar asociada con la proliferación de gérmenes resistentes a los antibióticos. Si esto ocurriese, se suspenderá la aplicación del antibiótico y se tomarán las medidas terapéuticas apropiadas.

Deje de usar **Eritroderm** y consulte a su médico inmediatamente si tiene una reacción alérgica, sensación de ardor grave, descamación y/o prurito en la piel o si desarrolla diarrea grave o prolongada.

Se ha descrito con el uso de eritromicina: dolor en la piel, erupción, piel seca, prurito, sensación de ardor, enrojecimiento de la piel, irritación, descamación.

En raros casos reacción alérgica, inflamación de la cara, erupción abultada (habones), dolor abdominal, diarrea, aumento de la sensibilidad de la piel a la luz solar, decoloración de la piel.

SOBREDOSIFICACIÓN

La intoxicación aguda es prácticamente imposible con el uso adecuado de **Eritroderm**.

COMO UTILIZAR Eritroderm

- Extender **Eritroderm** sobre las áreas afectadas, por la mañana y por la noche.
- En pieles sensibles puede comenzarse con una sola aplicación al día.
- Antes de la aplicación del producto se deben lavar, enjuagar y secar bien las zonas a tratar. Después de la aplicación se deben lavar las manos para evitar el contacto accidental con los ojos.

- Podrían requerirse de 6 a 8 semanas de tratamiento antes de observarse el efecto terapéutico completo. Si luego de 6-8 semanas no se observa mejoría o se empeora, se debe discontinuar el tratamiento.

- Duración máxima de tratamiento 6 meses.

PRESENTACIÓN

Estuches con pomos de 30 mL.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.

En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. – Tel.: 1722.

Producto medicinal.

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C.

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com o envíenos un correo electrónico a contacto@cimlatam.com o comuníquese directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

Venta bajo receta profesional.
Industria Uruguaya.
Elaborado en **ROEMMERS S.A.**
Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios 0800-3000
Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy



ROEMMERS

4829301840-02/05/18

4829301840



ROEMMERS

hM Digital

4829301840 Eritroderm

FORMATO

130x80

SOPORTE

PAP

ACTUALIZACIÓN

02/05/18

APROBACIÓN

02/05/18

PLEGADO

80 mm en 3



1 Tinta Pantone Negro

NEGRO