

Alerfast

Loratadina

Vía oral

Comprimidos - Jarabe

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmulas

Alerfast comprimidos: Cada comprimido contiene: Loratadina 10 mg; Lactosa 48 mg; Exc. c.s.

Alerfast jarabe: Cada 5 mL contiene: Loratadina 5 mg; azúcar 2,25 g; Exc. c.s.

¿Qué es Alerfast y para qué se utiliza?

La Loratadina es un antihistamínico que actúa compitiendo con la histamina por los receptores H1 en las células efectoras. De esta manera evita respuestas que son mediadas por la histamina, incluyendo la urticaria y el prurito. La Loratadina produce una leve broncodilatación e impide la broncoconstricción inducida por la histamina en pacientes asmáticos, asimismo disminuye el broncoespasmo inducido por el ejercicio y por hiperventilación. La Loratadina carece de efectos anticolinérgicos significativos y prácticamente no produce efectos sedantes (somnia) del sistema nervioso central, ya que tiene especial afinidad por los receptores H1 periféricos y no atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica.

La Loratadina se absorbe bien luego de la administración oral, la ingestión de alimentos puede aumentar la absorción. La duración de la acción es de alrededor de 24 horas.

Alerfast está indicado para:

Tratamiento y alivio de los síntomas de rinitis alérgica (estornudos, goteo o picazón nasal, escozor o picazón en los ojos) y tratamiento y alivio de los síntomas de urticaria idiopática crónica (picazón, enrojecimiento, y número y tamaño de las ronchas cutáneas).

1240202840-17/04/18

No tome Alerfast si:

- Presenta alergia a la loratadina.

Tenga precaución si:

Debe tenerse en cuenta la existencia de sensibilidad cruzada entre antihistamínicos, un paciente sensible a un antihistamínico, puede ser sensible a otros.

Si bien la Loratadina no tiene actividad anticolinérgica significativa, debe administrarse con precaución en pacientes con hipertrofia de próstata y en ancianos, ya que un posible deterioro de la función renal puede llevar a la acumulación del fármaco cuando se administra a las dosis usuales. En caso de que el clearance de creatinina sea menor de 30 mL/min, la dosis de Loratadina debe administrarse en días alternos. En pacientes con insuficiencia hepática grave es necesario ajustar dosis.

Embarazo y lactancia

Estudios animales no han demostrado efectos teratogénicos. No se ha establecido la seguridad del empleo de loratadina durante el embarazo en humanos, dado que no se han realizados estudios controlados en mujeres embarazadas. Categoría B (FDA). Loratadina se excreta en la leche materna, por lo que no está recomendada su administración en mujeres en periodo de lactancia. Ante cualquier duda consulte a su médico tratante.

Población pediátrica

No se recomienda este medicamento en niños menores de 2 años de edad.

Conducción y uso de máquinas:

A dosis normales, loratadina no afecta a la capacidad de conducir o utilizar máquinas. Si usted nota síntomas de somnolencia, no conduzca ni use máquinas, no obstante, procure no realizar tareas que puedan requerir una atención especial hasta que sepa cómo tolera el medicamento.

Información importante sobre algunos de los componentes de Alerfast

Alerfast comprimidos contiene Lactosa. Si presenta intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de mala absorción de glucosa o galactosa no debe tomar este medicamento.

Alerfast jarabe contiene azúcar (45 grs cada 100 ml).

Toma de Alerfast con otros medicamentos

Pueden ocurrir potenciales interacciones con todos los inhibidores conocidos de CYP3A4 o CYP2D6 (como algunos antidepresivos, antimicóticos y algunos antibióticos como la eritromicina), dando lugar a niveles elevados de loratadina, lo que puede causar un aumento de reacciones adversas.

Interacción con pruebas diagnósticas

Como todos los antihistamínicos, la Loratadina puede inhibir la respuesta cutánea a la histamina, produciendo resultados falsos negativos. En caso de ser necesario realizar pruebas cutáneas de alérgenos, Loratadina deberá ser suspendida una semana antes de las mismas.

Toma de Alerfast con los alimentos y bebidas

Loratadina puede tomarse con o sin alimentos.

ALERFAST - 1240202840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
1240202840	160x130	17/04/18	17/04/18	PAP	130 mm en 4

Diseño Gráfico hM Digital

Negro

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **Alerfast** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Frecuentes (menos de 1 por cada 10 pacientes pero más de 1 por cada 100 pacientes): somnolencia, dolor de cabeza, nerviosismo, cansancio, aumento del apetito y dificultad para dormir.

Raros (menos de 1 por cada 10000 pacientes): reacción alérgica grave, mareo, convulsiones, latidos cardíacos irregulares o rápidos, náuseas, sequedad de boca, estómago revuelto, problemas hepáticos, pérdida del cabello, erupción cutánea y cansancio.

¿Cómo tomar Alerfast?

Siga exactamente las instrucciones de administración de **Alerfast** indicadas por su médico. Debe tomarse por vía oral.

Recuerde tomar su medicamento. Su médico le indicará la duración del tratamiento. No suspenda el tratamiento antes.

Alerfast comprimidos

Adultos y niños mayores de 12 años de edad y peso superior a 30 kg:

1 comprimido (10 mg) una vez al día

Niños de 6 a 12 años de edad:

Peso superior a 30 kg:

1 comprimido (10 mg) una vez al día

Peso inferior a 30 kg:

1/2 comprimido (5 mg) una vez al día.

Pacientes con problemas hepáticos graves con un peso superior a 30 kg:

1 comprimido (10 mg), una vez al día y en días alternos.

ALERAFST comprimidos no es adecuado para:

- pacientes que tengan problemas para tragar

Alerfast jarabe

Adultos y niños mayores de 12 años de edad:

10 ml de **Alerfast** jarabe una vez al día.

Niños de 2 a 12 años de edad:

Peso superior a 30 kg: 10 ml de **Alerfast** jarabe una vez al día.

Peso igual o inferior a 30 kg: 5 ml de **Alerfast** jarabe una vez al día.

Pacientes con problemas hepáticos graves:

Adultos y niños de peso superior a 30 kg: 10 ml de **Alerfast** jarabe una vez al día, en días alternos.

Niños de peso igual o inferior a 30 kg: 5 ml de **Alerfast** jarabe, una vez al día, en días alternos.

No se recomienda **Alerfast** en niños menores de 2 años de edad.

Si toma más Alerfast del que debiera

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

En casos de sobredosis de Loratadina pueden aparecer somnolencia, taquicardia y cefalea. El tratamiento será sintomático y de mantenimiento de funciones vitales si estuviera indicado.

Presentaciones

Alerfast comprimidos: Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos.

1240202840-17/04/18

Alerfast jarabe: Envases conteniendo 50 mL.

Producto medicinal

Manténgase fuera del alcance de los niños

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C

Industria Uruguaya

Expendio bajo receta médica

Elaborado en **ROEMMERS S.A.**

Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay

Bolivia: Importado y distribuido por: **PHARMA INVESTI S.R.L.**

Calle Moldes N° 200 esquina calle La Paz - Zona Centro

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Farm. Resp. Dra. Madaj Diaz Yaca Mat. Prof. D-64

Reg. Sanitario N°: Comprimidos: II-22249/2015

Ecuador: Producto de uso delicado

Adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica

Importado y distribuido por **ROEMMERS S.A.** Ecuador

Línea PHARMA INVESTI

Perú: Para reportar reacciones adversas probables, por favor contacte a

LABORATORIOS ROEMMERS S.A. Telef.: 462-1616 Anexo 274 o ESCRÍBANOS a

farmacovigilancia@pe.roemmers.com

Importado por: **DROGUERIA LABORATORIOS ROEMMERS S.A.**

Jr. Faustino Sánchez Carrión 425, Lima 17 - Perú

D.T. Q.F.: Carmen Izaguirre Uribe

Uruguay: Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en

nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico

En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722

Control médico recomendado

Información a profesionales y usuarios

0800 - 3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de

eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o

error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página:

www.cimlatam.com o envíenos un correo electrónico a contacto@cimlatam.com.

Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según

estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.



ROEMMERS
CONCIENCIA POR LA VIDA

ALERFAST - 1240202840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
1240202840	160x130	17/04/18	17/04/18	PAP	130 mm en 4

Diseño Gráfico HM Digital

Negro

