

Algi Flex Algi Flex Gel

Piroxicam 10 mg /
Citrato de Orfenadrina 50 mg
Piroxicam al 0,5%

Vías oral - tópica

Comprimidos recubiertos - Gel

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.

Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmulas

Algi Flex: Cada comprimido recubierto contiene: Piroxicam 10 mg; Citrato de Orfenadrina 50 mg; Exc. c.s.

Algi Flex Gel: cada 70 g de gel contiene Piroxicam al 0,5%.

¿Qué es Algi Flex / Algi Flex Gel y para qué se utiliza?

Algi Flex combina piroxicam un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con propiedades antiinflamatorias y analgésicas, con orfenadrina, un fármaco relajante muscular con acción altamente específica que proporciona un rápido alivio de la contractura muscular.

Algi Flex Gel permite la utilización del piroxicam en forma local, directamente en la zona afectada.

Indicaciones terapéuticas

Algi Flex está indicado en todos los cuadros en los que coexistan dolor y contractura muscular de origen traumático o inflamatorio: lumbalgias, tenosinovitis (codo de tenista), esguinces, periartrosis escapulo-humeral (hombro doloroso), espondiloartrosis, dolor y contractura que acompañan la patología discal, afecciones osteomusculares, etc.

Algi Flex Gel se utiliza en todos aquellos cuadros que requieren acción tópica.

No tome este medicamento si:

- Es alérgico (hipersensible) a los principios activos de **Algi Flex / Algi Flex Gel**
- Tiene glaucoma (aumento de la presión ocular)

1387501840-09/08/17

- Padece miastenia gravis (enfermedad que causa debilidad muscular)
- Tiene hipertrofia prostática u obstrucción en el cuello de la vejiga
- Tiene obstrucción pilórica o duodenal o del colon
- Tiene úlcera péptica, sangrado digestivo, perforación de estómago o intestino
- Tiene acalasia de esófago (esófago dilatado)
- Tiene insuficiencia renal severa con clearance de creatinina menor a 30 mL/min
- Si está cursando el tercer trimestre de embarazo.

Tenga precaución:

- Si tiene antecedentes de alteraciones gastrointestinales que predispongan a trastornos hemorrágicos como: úlcera gástrica o duodenal, gastritis severa, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, cánceres gastrointestinales, diverticulitis.
- Si está tomando otros AINEs, incluyendo los selectivos de la COX 2, ácido acetil salicílico u otros antiagregantes plaquetarios (clopidogrel, dipiridamol, prasugrel, triflusal).
- Si tiene taquicardia, arritmias cardíacas, insuficiencia coronaria o descompensación cardíaca.
- Si está tomando anticoagulantes como warfarina.
- Si tiene enfermedad renal o hepática.
- Si tiene más de 70 años.
- En tratamientos prolongados deberá controlarse el perfil hematológico, las funciones hepática y renal.
- **Algi Flex Gel** no debe aplicarse sobre las mucosas, o en áreas cercanas a los ojos o sobre piel lesionada.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

- **Algi Flex** pueden potenciar el efecto de los hipoglucemiantes orales, anticoagulantes y antiépilépticos, por lo cual se aconseja un especial seguimiento de estos pacientes.
- No se aconseja el uso concomitantemente con alcohol, opiáceos o fenotiazínicos (clorpromazina, periciazina, tioridazina, pipotiazina).
- Debe evitarse el uso concurrente de orfenadrina con alcohol o con otros depresores del SNC (el uso concurrente puede resultar en efectos aditivos depresores del SNC; se recomienda precaución y reducción de la dosis de ambos agentes) y con otras medicaciones anticolinérgicas o con acción anticolinérgica (pueden intensificarse los efectos anticolinérgicos).
- Los principios activos que componen **Algi Flex** pueden tener interacciones si se toman junto con: otros AINEs (diclofenac, ketoprofeno, ibuprofeno, naproxeno, ketorolac) anticoagulantes y antiagregantes (warfarina, clopidogrel, ticlopidina, ácido acetil salicílico, heparina, heparina de bajo PM); antidepresivos: tricíclicos (amitriptilina, imipramina), inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS) (escitalopram, fluvoxamina, fluoxetina), bupropión; litio; antihipertensivos (IECA, ARA II, calcioantagonistas), antiinfecciosos: quinolonas, isoniazida, rifampicina, anfotericina B, ciclosporina, azoles (itraconazol, fluconazol, ketoconazol); metotrexate; antiácidos; antiidiabéticos (sulfonilureas); diuréticos sobre todo ahorradores de potasio; alcohol; ciclofosfamida; antiépilépticos (carbamazepina, fenitoína, fenobarbital o primidona), antipsicóticos atípicos (quetiapina).

Administración de Algi Flex, junto a bebidas y alimentos

Pueden administrarse junto o separado de los alimentos, esto no interfiere con su absorción, biodisponibilidad y posterior eficacia. Debe evitarse la ingesta de alcohol.

Algi Flex - 1387501840

1 tinta = Color

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
1387501840	160x130	09/08/17	09/08/17	PAP	130 mm en 4

Diseño Gráfico hM Creativos

Color



Embarazo y lactancia

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.
Embarazo: (Cat C FDA); potencialmente riesgoso, el médico tratante debe evaluar riesgo/beneficio previo a su administración. Contraindicado en el tercer trimestre de embarazo.
Lactancia: no está establecido el riesgo en lactantes

Conducción y uso de máquinas

La orfenadrina puede provocar somnolencia, relajación muscular y lentitud en la velocidad de reacción. No conduzca ni maneje maquinaria potencialmente riesgosa hasta que ud. compruebe como tolera el medicamento.

Cómo tomar Algi Flex

Siga exactamente las instrucciones de administración de **Algi Flex** indicadas por su médico. Las dosis habituales son:

Algi Flex: administrar 1 ó 2 comprimidos recubiertos al día.

Algi Flex Gel se aplica localmente 3 ó 4 veces por día masajeando ligeramente la zona para favorecer la penetración.

Uso en niños

No se ha demostrado su eficacia y seguridad en niños, razón por la cual su uso está contraindicado en pediatría.

Uso en poblaciones especiales

Ancianos: el médico debe evaluar riesgo/beneficio de su administración en pacientes mayores de 70 años.

Insuficiencia hepática y renal: no se recomienda su uso, el médico tratante valorará riesgo/beneficio de su administración.

Si toma más Algi Flex del que debiera

La orfenadrina es tóxica a dosis altas y típicamente provoca efectos anticolinérgicos tales como: sequedad de boca, midriasis, taquicardia, agitación, confusión, alucinaciones, retención urinaria y disminución de la motilidad gastrointestinal. Utilizado en dosis excesiva puede provocar efecto euforizante.

Con sobredosis severas puede ocurrir hipotensión, arritmias ventriculares, depresión respiratoria, convulsiones, hipoglicemia.

En caso de intoxicación consulte inmediatamente a la emergencia médica.

Si olvidó tomar Algi Flex

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **Algi Flex** puede producir efectos no deseados. Los efectos adversos descriptos con mayor frecuencia con el uso de piroxicam son dolor de cabeza, retención de líquidos principalmente en tobillos, hipertensión arterial. A nivel digestivo estreñimiento, gases, diarrea, dolor abdominal, pérdida del apetito, inflamación de la mucosa de la boca y del estómago, náuseas y vómitos. Con el uso de prednisona (a dosis altas) puede presentar signos de hiperactividad adrenal (Síndrome de Cushing!); erupciones, crecimiento de vello, hiperpigmentación cutánea, atrofia de la piel. En tratamientos prolongados insuficiencia adrenocortical (debilidad, sensación de cansancio todo el tiempo, pérdida de apetito y peso). Aumento de glicemia (azúcar en sangre), aumento de apetito, osteoporosis, úlcera de estómago. Disminución de linfocitos y eosinófilos en sangre, retraso en la cicatrización de heridas.

1387501840-09/08/17

Con el uso de orfenadrina se describe taquicardia, palpitaciones, piel seca, prurito, urticaria. A nivel digestivo constipación, náuseas, vómitos, boca seca. También debilidad, mareos, somnolencia, visión borrosa, dilatación pupilar, retención urinaria.

De forma poco frecuentemente se ha referido con el uso de piroxicam mareos, sensación de sueño, hemorragia digestiva, alteración de la función hepática. A nivel de piel erupción, enrojecimiento y picazón.

Excepcionalmente se ha reportado con el uso de piroxicam Síndrome de Stevens-Johnson y enfermedad de Lyell (que se caracterizan por ampollas y lesiones en piel y mucosas). Insuficiencia renal aguda, nefritis intersticial (trastorno inflamatorio del riñón).

No se alarme por esta lista de posibles efectos adversos. Lo más probable es que no presente ninguno de ellos. Ante cualquier duda, consulte a su médico.

Presentaciones

Algi Flex: Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos recubiertos.

Algi Flex Gel: Envases conteniendo 70 g de gel.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

Producto medicinal

Manténgase fuera del alcance de los niños

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.

En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.

Industria Uruguaya

Algi Flex comprimidos recubiertos: Control médico recomendado

Algi Flex Gel: Venta libre en condiciones reglamentarias

Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas, consulte a su médico

Elaborado en **ROEMMERS S.A.**

Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios

0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

www.roemmers.com.uy

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com

O envíenos un correo a contacto@cimlatam.com

Toda comunicación a través de este sitio es confidencial y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.



ROEMMERS
CONCIENCIA POR LA VIDA

Algi Flex - 1387501840

1 tinta = Color

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
1387501840	160x130	09/08/17	09/08/17	PAP	130 mm en 4

Diseño Gráfico hM Creativos

Color

