



COMPRIMIDOS PARA
DISOLUCIÓN BUCAL

ANTISÉPTICO BUCOFARÍNGEO
NEOMICINA 4 MG / BENZOCAÍNA 10 MG

Fórmula

Cada comprimido contiene: Neomicina (bajo forma de sulfato) 4,0 mg; Benzocaína 10 mg; Sucralosa, otros excipientes c.s.

Propiedades

BORWEB es una nueva fórmula antiséptica de uso tópico bucofaríngeo que posee una amplia acción antibacteriana contra los gérmenes invasores orales más frecuentes.

BORWEB actúa con eficacia en el tratamiento sintomático del dolor asociado a las afecciones orofaríngeas.

Contiene neomicina, un antibiótico bactericida de amplio espectro, perteneciente a la familia de los aminoglucósidos. Las especies grampositivas susceptibles incluyen el *S. aureus*, *S. faecalis* y el *M. tuberculosis*, los microorganismos gramnegativos, altamente sensibles son: *E. coli*, *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae* y *Proteus vulgaris*.

La benzocaína es un anestésico local muy útil para uso tópico que actúa bloqueando la sensibilidad dolorosa de la mucosa orofaríngea en forma selectiva, reversible y temporaria.

Indicaciones

BORWEB está especialmente indicado en infecciones bucofaríngeas que incluyen: faringitis, amigdalitis, laringitis y estomatitis.

Está indicado además como coadyuvante en el tratamiento sintomático del dolor asociado a las afecciones bucofaríngeas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad reconocida a alguno de los componentes de la fórmula.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30°C. Proteger de la luz.

Pacientes diabéticos consultar con su médico.

4623003840-09/07/18

Embarazo y lactancia. Consulte a su médico antes de usar BORWEB. Este medicamento no debe administrarse a niños menores de 6 años sin consultar antes al médico. Los niños pueden ser más sensibles a la benzocaína igual que los ancianos y los enfermos debilitados.

Efectos adversos

A las dosis recomendadas en general no se observan efectos adversos. Rara vez, puede presentarse alteración en la percepción del sabor, irritación en la boca o en la lengua, síntomas que suelen ser pasajeros.

Modo de empleo y posología

Dejar disolver en la boca un comprimido de BORWEB cada 4 a 6 horas.

La disolución debe ser lenta sin masticar ni tragar el comprimido.

Dosis máxima recomendada 6 comprimidos por día.

Presentación

BORWEB se presenta en envase de 8 comprimidos para disolución bucal.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.

En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.

Industria Uruguaya

Venta bajo receta profesional

Elaborado en **ROEMMERS S.A.**

Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios

0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

www.roemmers.com.uy

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com o envíenos un correo electrónico a contacto@cimlatam.com.

Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.



BORWEB - 4623003840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
4623003840	160x130	09/07/18	09/07/18	PAP	130 mm en 4

DISEÑO GRAFICO DIGITAL hM Creativos

Negro

