

EVIT®

Vitamina E

VÍA ORAL

Cápsulas blandas

LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE ANTES DE COMENZAR EL TRATAMIENTO

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

FÓRMULAS

Cada cápsula blanda de EVIT 400 contiene:
Vitamina E (dl-alfatocoferol acetato) 400 mg (400 U.I.)
Excipientes c.s.
Cada cápsula blanda de EVIT 1000 contiene:
Vitamina E (dl-alfatocoferol acetato) 1000 mg (1000 U.I.)
Excipientes c.s.

QUÉ ES EVIT Y PARA QUÉ SE UTILIZA

EVIT contiene **Vitamina E**. La **Vitamina E** es un poderoso antioxidante biológico. Previene la formación y la propagación de radicales libres nocivos que se generan tras la oxidación de los lípidos del propio organismo.

Debido a esta propiedad protege las membranas celulares desde el punto de vista funcional y contribuye a la estabilización de los lisosomas, de las mitocondrias y de los capilares, así como al mantenimiento de la resistencia de los glóbulos rojos.

La **Vitamina E** previene la oxidación del colesterol LDL y con ello su infiltración en la pared de las arterias, proceso inicial en el desarrollo de la arterioesclerosis.

La deficiencia de **Vitamina E** conduce a la acumulación de lipofuscina, pigmento vinculado con el desgaste y el envejecimiento de los tejidos. Asimismo, provoca la aparición de síntomas musculares y neurológicos.

Estudios recientes parecen confirmar la eficacia de la **Vitamina E** en ciertas afecciones degenerativas del sistema nervioso central, en particular en la enfermedad de Alzheimer en la que se ha reportado un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad tras la suplementación prolongada con altas dosis de **Vitamina E**.

4517804840-04/10/17

INDICACIONES

- Prevención y tratamiento del déficit de **Vitamina E**. En enfermedades con síndrome de malabsorción
- Fibrosis quística
- Enfermedad del tracto hepato-biliar (colestasis crónica, obstrucción biliar, atresia biliar)
- Abetalipoproteinemia.

QUÉ NECESITA SABER ANTES DE TOMAR EVIT

No tome EVIT si

- Es alérgico a la **Vitamina E** o a alguno de los excipientes
- Está en tratamiento con anticoagulantes orales
- Tiene déficit de vitamina K (la administración de grandes dosis de **Vitamina E** pueden exacerbar los defectos de la coagulación)

TENGA PRECAUCIÓN

Consulte a su médico antes de empezar a tomar EVIT

- No debe tomar dosis superiores a las recomendadas
- Si tiene riesgo de padecer tromboflebitis (hinchazón de una vena causada por un coágulo de sangre), la **Vitamina E** en dosis elevadas aumenta su riesgo, incluidas las mujeres que toman anticonceptivos con estrógenos (hormonas sexuales femeninas)
- Si tiene deficiencia de vitamina K (vitamina que interviene en la coagulación), grandes dosis de **Vitamina E** pueden aumentar los defectos de la coagulación
- Grandes dosis de **Vitamina E** pueden antagonizar a la vitamina K e inhibir la producción de protrombina.

NIÑOS Y ADOLESCENTES

Este medicamento puede administrarse en niños. Sin embargo, la forma farmacéutica puede no resultar adecuada para los niños pequeños, ya que podrían tener dificultad para deglutirla.

EMBARAZO Y LACTANCIA

Embarazo. No hay datos o estos son limitados relativos al uso de grandes dosis de **Vitamina E** en mujeres embarazadas. No se recomienda su uso durante este período.

Lactancia. No se dispone de información suficiente relativa a la eliminación de **Vitamina E** en la leche materna. No se recomienda su uso durante este período.

CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS

La influencia de EVIT sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DE EVIT

EVIT puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene Metilparabeno y Propilparabeno.

EVIT - 4517804840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	SIN PLEGAR
4517804840	160x130	04/10/17	04/10/17	PAP	

Diseño Gráfico hM Digital

Negro

USO DE OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

Los siguientes medicamentos pueden interactuar con EVIT cuando se emplean al mismo tiempo:

- Anticoagulantes orales (medicamentos para hacer la sangre más fluida), como acenocumarol, warfarina, dicumarol: posible aumento del riesgo de sangrado, ya que la **Vitamina E** aumenta su efecto
- Tocoferolosan (una forma de **Vitamina E**), que puede aumentar el efecto de este medicamento
- Estrógenos, incluidos los anticonceptivos orales: su administración concomitante con **Vitamina E** puede aumentar el riesgo de trombosis.

Medicamentos que afectan a la absorción gastrointestinal de la Vitamina E:

- Colestiramina y colestipol (para reducir los niveles de colesterol)
- Orlistat (para reducir la absorción de grasas)
- Aceite mineral o parafina líquida (ayudan a la evacuación del intestino)

Si se toman conjuntamente se deben espaciar las dosis al menos 2 horas.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, EVIT puede producir efectos no deseados.

Se han descrito pocos casos de efectos adversos, incluso a dosis altas. Pueden aparecer, raramente (<1%): alteraciones emocionales, diarrea, malestar gástrico, espasmos intestinales, debilidad muscular, dolor de cabeza, fatiga, trastornos vasculares, visión borrosa, y náuseas.

CÓMO TOMAR EVIT

Siga exactamente las instrucciones de administración indicadas por su médico y respete las dosis recomendadas para cada tipo de trastorno.

EVIT se toma por vía oral. Las cápsulas deben ingerirse enteras con un poco de agua u otro líquido, durante o después de las comidas.

Adultos y niños mayores de 10 años

Deficiencia de Vitamina E: 50 UI de dl-alfa tocoferol acetato por día. En determinados casos el médico podría indicar la toma de 100-150 UI al día, o hasta un máximo de 300 UI o mg al día.

Síndromes de malabsorción: en general se recomiendan entre 200 a 400 UI al día o 15-25 mg/kg de peso/día.

Fibrosis quística: entre 100 y 400 UI al día

Enfermedad del tracto hepato-biliar: se administrará la dosis que supla la deficiencia de **Vitamina E**. En colestasis crónica, se recomiendan de 50 a 400 UI al día.

Abetalipoproteinemia: se recomiendan entre 50 y 300 UI/kg de peso/día. En enfermedad de Alzheimer se recomienda hasta 2000 UI por día (dosis que únicamente se debe utilizar en esta patología).

4517804840-04/10/17

SI TOMA MAS EVIT DEL QUE DEBIERA

Síntomas de toxicidad por **Vitamina E**

La **Vitamina E** en dosis excesivas (en general dosis partir de 300 UI) puede causar náuseas, diarrea y otros trastornos digestivos y, en personas predispuestas, puede producir tromboflebitis y agravar problemas de coagulación; también puede causar mal funcionamiento de las gónadas (glándulas sexuales), dolor de senos, aumento del colesterol y triglicéridos y reducción de hormonas del tiroides en sangre.

En caso de sobredosis se deberá interrumpir el tratamiento con este medicamento y se procederá a la instauración de tratamiento sintomático. Los efectos generalmente desaparecen tras la interrupción de la administración.

PRESENTACIONES

EVIT 400: Envases conteniendo 20 cápsulas blandas.

EVIT 1000: Envases conteniendo 20 cápsulas blandas.

Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.

En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.

PRODUCTO MEDICINAL.

CONTROL MÉDICO RECOMENDADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE INFERIOR A 30°C. PROTEGER DE LA LUZ.

INDUSTRIA URUGUAYA.

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com
O envíenos un correo a contacto@cimlatam.com
Toda comunicación a través de este sitio es confidencial y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

Fabricado por **GELCAPS**, México
ROEMMERS S.A. Uruguay
Cno. Maldonado 5634, Montevideo
Atención Personalizada a Profesionales
y Usuarios 0800-3000
Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy



EVIT - 4517804840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	SIN PLEGAR
4517804840	160x130	04/10/17	04/10/17	PAP	

Diseño Gráfico hM Digital

Negro