

# Vixiderm E 5%

## Gel

Peróxido de benzoilo  
5%

### Vía de administración tópica dérmica

#### LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE ANTES DE COMENZAR EL TRATAMIENTO

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.

Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

#### FÓRMULA

Cada 100 g contiene:

Peróxido de benzoilo..... 5 g

Excipientes .....c.s.

#### ¿QUÉ ES Vixiderm E Gel Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Vixiderm E Gel contiene como principio activo peróxido de benzoilo, el cual posee actividad antimicrobiana, sebostática (reguladora de grasa) y queratolítica y es capaz de detener el crecimiento de *Propionibacterium acné*, el microorganismo causante del acné.

Vixiderm E Gel está indicado para el tratamiento local sintomático del acné vulgar

moderado en adultos y adolescentes a partir de 12 años.

#### POSOLOGÍA - ADMINISTRACIÓN

Lavar las zonas afectadas antes de la aplicación del gel y aplicar una delgada capa sobre dicha área con masaje suave. Aplicar 1 ó 2 veces por día, según indicación del médico. Según los casos, puede iniciarse su uso gradualmente y recién después de comprobada la tolerancia, dejar el medicamento aplicado toda la noche.

#### NO USE ESTE MEDICAMENTO SI:

Es alérgico (hipersensible) al peróxido de benzoilo o a cualquiera de los demás componentes de Vixiderm E Gel.

#### PRECAUCIONES

- Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Vixiderm E Gel.
- Para uso externo solamente.
- No usar simultáneamente ni agregar ninguna otra sustancia a este gel, a menos que sea específicamente indicado por el médico.
- Pielés muy sensibles
- En la aplicación inicial puede presentarse una ligera y transitoria sensación de quemadura que desaparece con el uso.
- Vixiderm E Gel tiene acción queratolítica y desecante, razón por la cual la luz ultravioleta y la luz fría de cuarzo deben ser empleadas en menor grado en caso de tratamiento concomitante.
- Vixiderm E Gel puede causar, en raros casos, irritación de la piel y cierto enrojecimiento. Para prevenir este posible efecto se recomienda comenzar la aplicación en un área pequeña, extendiéndola a la zona afectada al cabo de unos días. Si se produce irritación ligera, deben espaciarse las aplicaciones. Si persiste o es intensa, suspender la aplicación. Limpiar la piel con agua y jabón. De continuar la irritación después de haber suspendido el tratamiento, consulte al médico.
- No debe aplicarse sobre piel dañada o eczematosa, ni sobre cortes o abrasiones. Evitar el contacto con los ojos, labios, boca, orificios nasales, membranas, mucosas, y zonas sensibles del cuello. En caso de

4830501840-23/03/18

## Vixiderm E 5% - 4830501840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
4830501840	80x130	23/03/18	23/03/18	PAP	80 mm en 3

Diseño Gráfico hM Digital

Negro



- producirse un contacto accidental, lavar inmediatamente con agua.
- Puede producir decoloración del cabello y ciertos tejidos.
  - No deben usarse limpiadores abrasivos simultáneamente con **Vixiderm E Gel**.
  - Evitar el contacto con ropas de color, para prevenir posible decoloración.

#### EMBARAZO Y LACTANCIA

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento. **Vixiderm E Gel** no debe utilizarse durante el embarazo. Sólo deberá administrarse **Vixiderm E Gel** a mujeres embarazadas cuando una evaluación del médico determine que el beneficio supera el riesgo potencial, ya que no se ha establecido la seguridad del peróxido de benzilo.

Se desconoce si este medicamento se excreta en la leche materna, por lo que debe administrarse con precaución a mujeres en periodo de lactancia, y no deberá aplicarse en el pecho para evitar la transferencia al lactante.

#### USO DE OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

No use este medicamento junto con otros medicamentos o cosméticos con efectos descamativos, irritantes y desecantes.

**Vixiderm E Gel** puede combinarse bajo control médico con otras sustancias indicadas para el tratamiento de la seborrea y el acné.

#### POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, **Vixiderm E Gel** puede producir efectos no deseados.

Frecuentes (puede afectar a más de 1 de cada 10 personas): leve sensación de ardor con la primera aplicación y aparición, a los pocos días, de un enrojecimiento moderado, sequedad y descamación cutánea. Durante las primeras semanas de tratamiento podría producirse un aumento repentino de la descamación, enrojecimiento, escozor y prurito en la mayoría de los pacientes; esto no es perjudicial y normalmente desaparece en uno o dos días si se interrumpe el tratamiento temporalmente.

Raros (puede afectar hasta 1 de cada 1.000 personas): dermatitis alérgica.

Frecuencia no conocida: inflamación facial temporal, dermatitis o sarpullido. En estos casos se debe interrumpir de inmediato el tratamiento y consultar al médico. Estas reacciones suelen ser reversibles.

#### PRESENTACIÓN

Pomo conteniendo 40 gramos.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.

En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.

#### Mantener fuera del alcance de los niños


Conservar a temperatura ambiente inferior a 25 °C

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: [www.cimatam.com](http://www.cimatam.com) o envíenos un correo electrónico a [contacto@ciamatam.com](mailto:contacto@ciamatam.com).

Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

#### Control Médico Recomendado

Uso externo  
Elaborado en **Roemmers S.A.**  
Cno. Maldonado 5634,  
Montevideo, Uruguay

 Atención Personalizada  
a Profesionales y Usuarios 0800-3000  
Lunes a Viernes  
de 9 a 17 hs.  
[www.roemmers.com.uy](http://www.roemmers.com.uy)



**ROEMMERS**  
CONCIENCIA POR LA VIDA

4830501840-23/03/18

## Vixiderm E 5% - 4830501840

1 tinta = Negro

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
4830501840	80x130	23/03/18	23/03/18	PAP	80 mm en 3

Diseño Gráfico hM Digital

**Negro**

