

DISALER®

Dexclorfeniramina maleato 2 mg

Vía oral

Comprimidos

LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE ANTES DE COMENZAR EL TRATAMIENTO

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

FÓRMULA

Cada comprimido de DISALER contiene:

<i>Dexclorfeniramina maleato</i>	2 mg
Lactosa.....	78 mg
Excipientes:	c.s.

¿QUÉ ES DISALER Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Dexclorfeniramina pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como antihistamínicos. DISALER está indicado para el tratamiento sintomático de la rinitis alérgica estacional y perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, manifestaciones alérgicas cutáneas no complicadas leves de urticaria y angioedema y reacciones a sangre o plasma.

También está indicado en el tratamiento de reacciones anafilácticas conjuntamente con adrenalina u otras medidas adecuadas, después de controlar las manifestaciones agudas. DISALER alivia las manifestaciones cutáneas tales como eczema alérgico, dermatitis atópica y de contacto, picaduras de insectos, dermografismos y reacciones medicamentosas.

NO TOME ESTE MEDICAMENTO SI:

- es alérgico a maleato de *Dexclorfeniramina* o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento
- DISALER no debe ser administrado a recién nacidos y prematuros.
- está bajo tratamiento con un tipo especial de antidepresivos conocidos como inhibidores de la monoamino-oxidasa (MAO) o durante las dos semanas siguientes a la interrupción del tratamiento.

TENGA PRECAUCIÓN:

- si padece glaucoma de ángulo estrecho, cierta clase de úlcera de estómago (estenosante), obstrucción piloroduodenal, enfermedades de la próstata o estrechez de cuello de la vejiga urinaria, enfermedades cardiovasculares, incluyendo hipertensión arterial, o si padece aumento de la presión intraocular o enfermedades del tiroides.
 - si tiene más de 60 años, ya que en pacientes mayores de 60 años, DISALER puede causar mareos, sedación y bajadas de tensión.
- Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de DISALER en niños menores de 6 años, por lo que no se recomienda su administración en esta población.

EMBARAZO Y LACTANCIA

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

Embarazo

DISALER no debe administrarse durante el tercer trimestre del embarazo debido a que el recién nacido y los niños prematuros tienen mayor riesgo de reacciones adversas a los antihistamínicos. Durante los dos primeros trimestres de embarazo sólo se utilizará DISALER si su médico lo considera necesario.

Lactancia

Se desconoce si DISALER es eliminado por la leche humana, por lo que debe consultar con su médico si está en periodo de lactancia.

CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS

DISALER puede producir somnolencia alterando la capacidad mental y/o física. Si nota estos efectos evite conducir vehículos o utilizar máquinas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DE DISALER

DISALER contiene Lactosa. Si presenta intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de mala absorción de glucosa o galactosa no debe tomar este medicamento.

USO DE OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

Un tipo especial de antidepresivos conocidos como inhibidores de la monoaminoxidasa prolongan e intensifican el efecto de los antihistamínicos, pudiendo producir hipotensión grave, es decir, bajadas graves de la tensión arterial.

El uso simultáneo de **DISALER** con antidepresivos del grupo de los tricíclicos, barbitúricos u otros medicamentos que actúan en el sistema nervioso central puede potenciar el efecto sedante del **DISALER**.

Los medicamentos del grupo del **DISALER** (antihistamínicos) pueden disminuir la acción de los anticoagulantes orales, por lo que debe consultar con su médico antes de tomar **DISALER**.

TOMA DE DISALER CON LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS

El uso simultáneo de **DISALER** con alcohol, puede potenciar el efecto sedante del **DISALER**.

Interacción con pruebas de laboratorio.

El tratamiento con **DISALER** debe suspenderse al menos 48 horas antes de realizar cualquier prueba cutánea de alergia, ya que los medicamentos del grupo del **DISALER** (antihistamínicos) pueden enmascarar el resultado de estas pruebas.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, **DISALER** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

El efecto adverso observado más frecuentemente con el uso de **DISALER** (antihistamínicos) es somnolencia de ligera a moderada. Se han notificado efectos adversos generales tales como urticaria, erupción cutánea, reacciones alérgicas graves (shock anafiláctico), sensibilidad a la luz, sudoración excesiva, escalofríos, sequedad de boca, nariz y garganta.

Otros efectos adversos que pueden presentarse con el uso de antihistamínicos son los siguientes: reacciones cardiovasculares, reacciones en la sangre, reacciones del sistema nervioso, reacciones gastrointestinales, reacciones genitourinarias y reacciones respiratorias.

No se alarme por esta lista de posibles efectos adversos. Lo más probable es que no presente ninguno de ellos. Ante cualquier duda, consulte a su médico.

CÓMO TOMAR DISALER

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.

Su médico le indicará su dosis individualizada de acuerdo con las necesidades de la enfermedad y su respuesta.

En adultos y niños a partir de 12 años: la dosis recomendada es un comprimido 3 ó 4 veces al día, hasta un máximo de 6 comprimidos al día. Ingiera los comprimidos con una cantidad suficiente de líquido - un vaso de agua.

Uso en niños

Niños de 6 a 12 años: un máximo total de 3 comprimidos repartidos en tres tomas. Ingiera los comprimidos con una cantidad suficiente de líquido – un vaso de agua.

SI OLVIDÓ TOMAR DISALER

Es importante tomar **DISALER** como fue indicado por el médico. Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Si esto sucede cuando es casi la hora para su próxima dosis, tome solamente la dosis habitual en ese momento. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

SI TOMA MÁS DISALER DEL QUE DEBIERA

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al CIAT.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 20 comprimidos.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. – Tel: 1722

PRODUCTO MEDICINAL.

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE, INFERIOR A 30 °C.

INDUSTRIA URUGUAYA.



ROEMMERS S.A. Uruguay

Cno. Maldonado 5634. Montevideo

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios

0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

www.roemmers.com.uy